


Α' ΜΕΡΟΣ



ΑΛΓΕΒΡΑ








1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ



ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

- 1.1 Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς (επαναλήψεις - συμπληρώσεις)
- 1.2 Μονώνυμα - Πράξεις με μονώνυμα
- 1.3 Πολυώνυμα - Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων
- 1.4 Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων
- 1.5 Αξιοσημείωτες ταυτότητες
- 1.6 Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων
- 1.7 Διάρθρωση πολυωνύμων
- 1.8 Ε.Κ.Π. και Μ.Κ.Δ. ακεραίων αλγεβρικών παραστάσεων
- 1.9 Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις
- 1.10 Πράξεις ρητών παραστάσεων

Γενικές ασκήσεις 1ου κεφαλαίου
Επανάληψη - Ανακεφαλαίωση



1.1

Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς (επαναλήψεις – συμπληρώσεις)



- ✓ *Θυμάμαι τους πραγματικούς αριθμούς, τις τεχνικές και τις βασικές ιδιότητες των πράξεών τους.*
- ✓ *Εμπεδώνω τις ιδιότητες των δυνάμεων.*
- ✓ *Γνωρίζω τις ιδιότητες των ριζών και μαθαίνω να τις χρησιμοποιώ.*



A Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους

Πραγματικοί αριθμοί είναι όλοι οι αριθμοί που γνωρίσαμε στις προηγούμενες τάξεις.

Π.χ. $\frac{3}{4}$, $-\frac{5}{2}$, 7,34, $\sqrt{2}$, 3, π , $\frac{\sqrt{5}}{3}$, $\sqrt{4}$, -0,5, $1 + \sqrt{3}$, 6,1010010001...


Οι πραγματικοί αριθμοί αποτελούνται από τους ρητούς και τους άρρητους αριθμούς.

Ρητός λέγεται κάθε αριθμός που έχει ή μπορεί να πάρει τη μορφή ενός κλάσματος $\frac{\mu}{\nu}$, όπου μ , ν ακέραιοι αριθμοί και $\nu \neq 0$.

$\frac{3}{4}$, $-\frac{5}{2} = \frac{-5}{2}$, $7,34 = \frac{734}{100}$,
 $3 = \frac{3}{1}$, $\sqrt{4} = 2 = \frac{2}{1}$, $-0,5 = \frac{-5}{10}$.

Άρρητος λέγεται κάθε αριθμός που δεν είναι ρητός.

$\sqrt{2}$, π , $\frac{\sqrt{5}}{3}$, $1 + \sqrt{3}$, 6,1010010001...



Κάθε πραγματικός αριθμός παριστάνεται μ' ένα σημείο πάνω σ' έναν άξονα.

Η **απόλυτη τιμή** ενός πραγματικού αριθμού a συμβολίζεται με $|a|$ και είναι ίση με την απόσταση του σημείου, που παριστάνει τον αριθμό a , από την αρχή του άξονα.

Για παράδειγμα: $|-2| = 2$, $|2| = 2$, $|0| = 0$, $|\frac{-3}{4}| = \frac{3}{4}$

Οι πράξεις στους πραγματικούς αριθμούς

Πρόσθεση

- Για να προσθέσουμε δύο **ομόσημους** αριθμούς, προσθέτουμε τις απόλυτες τιμές τους και στο άθροισμά τους βάζουμε πρόσημο, το κοινό τους πρόσημο.

$$+7 + 5 = +12$$

$$-7 - 5 = -12$$

- Για να προσθέσουμε δύο **ετερόσημους** αριθμούς, αφαιρούμε την μικρότερη απόλυτη τιμή από τη μεγαλύτερη και στη διαφορά τους βάζουμε πρόσημο, το πρόσημο του αριθμού που έχει τη μεγαλύτερη απόλυτη τιμή.

$$\begin{aligned} +5 - 7 &= -2 \\ -5 + 7 &= +2 \end{aligned}$$

Πολλαπλασιασμός

- Για να πολλαπλασιάσουμε δύο **ομόσημους** αριθμούς, πολλαπλασιάζουμε τις απόλυτες τιμές τους και βάζουμε πρόσημο +
- Για να πολλαπλασιάσουμε δύο **ετερόσημους** αριθμούς, πολλαπλασιάζουμε τις απόλυτες τιμές τους και βάζουμε πρόσημο -

$$\begin{aligned} (+5) \cdot (+7) &= +35 \\ (-5) \cdot (-7) &= +35 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (+5) \cdot (-7) &= -35 \\ (-5) \cdot (+7) &= -35 \end{aligned}$$

Οι ιδιότητες της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού

Για την πρόσθεση και τον πολλαπλασιασμό ισχύουν οι ιδιότητες:

Ιδιότητα	Πρόσθεση	Πολλαπλασιασμός
Αντιμεταθετική	$a + b = b + a$	$ab = ba$
Προσεταιριστική	$a + (b + c) = (a + b) + c$	$a(bc) = (ab)c$
Ουδέτερο στοιχείο	$a + 0 = a$	$a \cdot 1 = a$
	$a + (-a) = 0$	$a \cdot \frac{1}{a} = 1, \quad a \neq 0$
Επιμεριστική	$a(b + c) = ab + ac$	

Υπενθυμίζουμε ακόμη ότι:

- $a \cdot 0 = 0$.
- Αν $ab = 0$, τότε $a = 0$ ή $b = 0$.
- Δύο αριθμοί που έχουν άθροισμα μηδέν, λέγονται **αντίθετοι**.
- Δύο αριθμοί που έχουν γινόμενο τη μονάδα, λέγονται **αντίστροφοι**.

$$\begin{aligned} -3, \quad 3 \\ \frac{4}{5}, \quad \frac{5}{4} \end{aligned}$$

Αφαίρεση – Διαίρεση

Οι πράξεις της αφαίρεσης και της διαίρεσης γίνονται με τη βοήθεια της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού αντιστοίχως.

- Για να βρούμε τη διαφορά δύο αριθμών, προσθέτουμε στο μειωτέο τον αντίθετο του αφαιρετέου.

$$\begin{aligned} 5 - 7 &= 5 + (-7) = -2 \\ 5 - (-7) &= 5 + (+7) = 12 \end{aligned}$$

$$a - b = a + (-b)$$

- Για να βρούμε το πηλίκο δύο αριθμών ($a : b$, ή $\frac{a}{b}$ με $b \neq 0$), πολλαπλασιάζουμε το διαιρετέο με τον αντίστροφο του διαιρέτη.

$$-5 : 15 = -5 \cdot \frac{1}{15} = -\frac{5}{15} = -\frac{1}{3}$$

$$a : b = a \cdot \frac{1}{b} \quad \text{ή} \quad \frac{a}{b} = a \cdot \frac{1}{b}$$



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1 Να υπολογιστούν οι παραστάσεις:

$$\alpha) (-3) \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) - \left(-\frac{1}{3} + 3\right) - \left(+\frac{1}{3}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \quad \beta) \frac{-3 + \frac{1}{2}}{2 - \frac{1}{3}}$$

Λύση

$$\alpha) (-3) \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) - \left(-\frac{1}{3} + 3\right) - \left(+\frac{1}{3}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = +\frac{9}{2} + \frac{1}{3} - 3 - \left(-\frac{1}{6}\right) =$$

$$= +\frac{9}{2} + \frac{1}{3} - 3 + \frac{1}{6} = \frac{27}{6} + \frac{2}{6} - \frac{18}{6} + \frac{1}{6} = \frac{12}{6} = 2$$

$$\beta) \frac{-3 + \frac{1}{2}}{2 - \frac{1}{3}} = \frac{-\frac{6}{2} + \frac{1}{2}}{\frac{6}{3} - \frac{1}{3}} = \frac{-\frac{5}{2}}{\frac{5}{3}} = -\frac{15}{10} = -\frac{3}{2}$$

2 Αν $\alpha + \beta = -3$ και $\gamma + \delta = -5$, να βρεθεί η αριθμητική τιμή της παράστασης $A = -(\gamma - 2\alpha) + 2(\beta - \frac{\delta}{2})$.

Λύση

$$A = -(\gamma - 2\alpha) + 2\left(\beta - \frac{\delta}{2}\right) =$$

$$= -\gamma + 2\alpha + 2\beta - \delta = \quad (\text{επιμεριστική ιδιότητα})$$

$$= 2\alpha + 2\beta - \gamma - \delta = \quad (\text{αντιμεταθετική ιδιότητα})$$

$$= 2(\alpha + \beta) - (\gamma + \delta) = \quad (\text{επιμεριστική ιδιότητα})$$

$$= 2(-3) - (-5) =$$

$$= -6 + 5 =$$

$$= -1$$



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

1 Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα σημειώνοντας «x» στην κατάλληλη θέση.

	-3	$\frac{1}{2}$	6	0,3	-0,8	$\sqrt{3}$	$\sqrt{16}$	3,14	π	$\frac{22}{7}$
Ακέραιος										
Ρητός										
Άρρητος										

2 Να συμπληρώσετε τις ισότητες:

$$\alpha) -3 + 7 = \dots \quad \beta) -6 + 6 = \dots \quad \gamma) -2 - 9 = \dots$$

$$\delta) (-2) \cdot \frac{1}{3} = \dots \quad \epsilon) 0 \cdot \left(-\frac{2}{7}\right) = \dots \quad \sigma\tau) \left(-\frac{4}{5}\right) \cdot \left(-\frac{5}{4}\right) = \dots$$

$$\zeta) (-6) : \left(-\frac{12}{5}\right) = \dots \quad \eta) \left(-\frac{8}{5}\right) : (+4) = \dots \quad \theta) \left(-\frac{4}{3}\right) : \left(+\frac{4}{3}\right) = \dots$$

3 Να συμπληρώσετε τις ισότητες:

α) $(-3 \cdot 2 - 5)x = \dots\dots\dots$ β) $-3(2 - 5x) = \dots\dots\dots$ γ) $-3(2 - 5)x = \dots\dots\dots$
 δ) $-2(x \dots \dots) = \dots\dots + 6$ ε) $(3 + x)(2 + y) = \dots\dots\dots$ στ) $4(\dots + \dots) = 12x + 8$

4 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:

i) Αν δύο αριθμοί είναι αντίθετοι, τότε:

- α) είναι ομόσημοι β) έχουν ίσες απόλυτες τιμές
 γ) έχουν γινόμενο μηδέν δ) έχουν γινόμενο τη μονάδα.

ii) Αν δύο αριθμοί είναι αντίστροφοι, τότε:

- α) είναι ετερόσημοι β) έχουν άθροισμα μηδέν
 γ) έχουν ίσες απόλυτες τιμές δ) έχουν γινόμενο τη μονάδα.

5 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με (Σ), αν είναι σωστές ή με (Λ), αν είναι λανθασμένες:

- α) Οι αντίστροφοι αριθμοί είναι ομόσημοι.
 β) Το άθροισμα δύο ομόσημων αριθμών είναι θετικός αριθμός.
 γ) Η απόλυτη τιμή κάθε πραγματικού αριθμού είναι θετικός αριθμός.
 δ) Δύο αριθμοί με γινόμενο θετικό και άθροισμα αρνητικό είναι αρνητικοί.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

1 Να κάνετε τις πράξεις:

α) $2 + 3 \cdot 4 - 12 : (-4) + 1$ β) $2 + 3 \cdot (4 - 12) : (-4 + 1)$
 γ) $-3 \cdot (-2) - 5 + 4 : (-2) - 6$ δ) $-8 : (-3 + 5) - 4 \cdot (-2 + 6)$

2 Τα αποτελέσματα των παρακάτω πράξεων σχηματίζουν το έτος που έγινε ένα γεγονός στη χώρα μας με παγκόσμιο ενδιαφέρον.

$$\begin{aligned} -(5 - 4) - (+2) + (-6 + 4) - (-7) &= \square \\ 4 - (-2 + 6 - 3) + (-9 + 6) &= \square \\ 14 + (-6 + 5 - 3) - (-4 - 1) \cdot (-2) &= \square \\ (-3) \cdot (-2) + 4 - (+5) - (-1) : (-1) &= \square \end{aligned}$$

3 Ένα αυτοκίνητο ξεκίνησε από τη θέση Ο, κινήθηκε πάνω στον άξονα $x'x$ προς τα αριστερά στη θέση Β και στη συνέχεια προς τα δεξιά στη θέση Γ. Αν είναι $OA = 5$ km, τότε να βρείτε πόσο διάστημα διήνυσε το αυτοκίνητο και πόσο μετακινήθηκε από την αρχική του θέση.



4 Να υπολογίσετε τις παραστάσεις:

α) $\frac{2}{3} - (-\frac{1}{4}) + (-\frac{1}{2}) - (+\frac{1}{12})$ β) $-(-\frac{1}{3} + \frac{3}{2} - \frac{5}{6}) + (-\frac{1}{2} + \frac{5}{3} - \frac{11}{6})$

γ) $-5 \cdot \frac{1}{2} - \frac{2}{3} - 5 \cdot (\frac{1}{2} - \frac{2}{3})$ δ) $(1 - \frac{7}{2}) \cdot (\frac{1}{2} - \frac{4}{5}) - \frac{3}{5} : (-\frac{2}{5} + \frac{2}{3})$

5 Να υπολογίσετε τις παραστάσεις:

α) $\frac{-\frac{1}{2} + \frac{2}{3} - 1}{3 - \frac{1}{6} + \frac{1}{2}}$ β) $\frac{-2 \cdot 3 - \frac{1}{4}}{-2 \cdot (3 - \frac{1}{4})}$ γ) $-7 + \frac{-3 - \frac{1}{3}}{-2 + \frac{1}{3}}$

6 Οι ελάχιστες θερμοκρασίες μιας πόλης το πρώτο δεκαήμερο του έτους ήταν:

1, -3, 0, 2, 1, -2, -5, 0, -3, -1.

Να βρείτε τη μέση ελάχιστη θερμοκρασία της πόλης το δεκαήμερο αυτό.



7 Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά χρησιμοποιώντας το κατάλληλο σύμβολο (+ ή -).

α) $12 \dots 5 \dots 20 = -3$ β) $-8 \dots 9 \dots 1 = 0$
 γ) $\frac{5}{4} \dots \frac{3}{4} \dots \frac{10}{4} = 3$ δ) $-0,35 \dots 6,15 \dots 8,50 = 2$

8 Να αποδείξετε τις παρακάτω ισότητες:

α) $8 - (α - β) + (α - 5 - β) = 3$
 β) $2 - (α + β - γ) - (4 + γ - β) - (-2 - α) = 0$
 γ) $-2 \cdot (α - 3) + α \cdot (-7 + 9) - 3 \cdot (+2) = 0$

9 Αν $x + y = -5$ και $ω + φ = -7$, να υπολογίσετε τις παραστάσεις:

$A = 4 - (x - ω) - (y - φ)$ $B = -(-5 - x + φ) + (-8 + y) - (ω - 4)$

10 Αν α, β είναι οι διαστάσεις ενός ορθογωνίου, που έχει περίμετρο 56 και γ, δ οι διαστάσεις ενός άλλου ορθογωνίου, που έχει περίμετρο 32, να υπολογίσετε την παράσταση $A = α - (9 - 2γ) - (15 - β - 2δ)$.

11 Να τοποθετήσετε καθέναν από τους παρακάτω αριθμούς

-7, -6, -5, -3, 1, 2, 4, 5, 9
 σε ένα τετράγωνο, ώστε τα τρία αθροίσματα να είναι ίσα μεταξύ τους.

+ + =

+ + =

+ + =

B Δυνάμεις πραγματικών αριθμών

Η **δύναμη** με βάση έναν πραγματικό αριθμό a και εκθέτη ένα φυσικό αριθμό $n \geq 2$ συμβολίζεται με a^n και είναι το γινόμενο n παραγόντων ίσων με τον αριθμό a .

Δηλαδή $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_n$
 n - παράγοντες

$$2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$$

$$(-3)^2 = (-3) \cdot (-3) = 9$$

Ορίζουμε ακόμη:

$$a^1 = a$$

$$a^0 = 1 \quad \text{με} \quad a \neq 0$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad \text{με} \quad a \neq 0$$

Για τις δυνάμεις με εκθέτες ακέραιους αριθμούς και εφόσον αυτές ορίζονται, ισχύουν οι ιδιότητες:

Ιδιότητες	Παραδείγματα
$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	$2^3 \cdot 2^4 = 2^{3+4} = 2^7$
$a^m : a^n = a^{m-n}$	$3^5 : 3^3 = 3^{5-3} = 3^2$
$(a\beta)^n = a^n \beta^n$	$(2x)^2 = 2^2 x^2 = 4x^2$
$\left(\frac{a}{\beta}\right)^n = \frac{a^n}{\beta^n}$	$\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2^3}{3^3} = \frac{8}{27}$
$(a^m)^n = a^{mn}$	$(2^{-3})^{-2} = 2^6 = 64$
$\left(\frac{a}{\beta}\right)^{-n} = \left(\frac{\beta}{a}\right)^n$	$\left(\frac{2}{3}\right)^{-4} = \left(\frac{3}{2}\right)^4$



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1 Να υπολογιστούν οι παραστάσεις:

α) $\frac{(-2)^2 \cdot (-3)^3}{(3 \cdot 2^2)^2}$ β) $x^2 \cdot (x \cdot y^2)^3 : (x^2 \cdot y^3)^2$

Λύση

α) $\frac{(-2)^2 \cdot (-3)^3}{(3 \cdot 2^2)^2} = \frac{2^2 \cdot (-3^3)}{3^2 \cdot (2^2)^2} = \frac{-2^2 \cdot 3^3}{3^2 \cdot 2^4} = -\frac{3}{2^2} = -\frac{3}{4}$

β) $x^2(xy^2)^3 : (x^2y^3)^2 = \frac{x^2(xy^2)^3}{(x^2y^3)^2} = \frac{x^2x^3(y^2)^3}{(x^2)^2(y^3)^2} = \frac{x^5y^6}{x^4y^6} = x$

2 Αν $x^3 \cdot y^2 = -3$, να υπολογιστεί η παράσταση $A = x^2 \cdot (x^2 \cdot y^3)^2 \cdot (x^{-1})^{-3}$.

Λύση

$$A = x^2 \cdot (x^2 \cdot y^3)^2 \cdot (x^{-1})^{-3} = x^2 \cdot x^4 \cdot y^6 \cdot x^3 = x^2 \cdot x^4 \cdot x^3 \cdot y^6 = x^9 \cdot y^6 = (x^3 \cdot y^2)^3 = (-3)^3 = -27.$$

3 Να υπολογιστούν οι παραστάσεις:

$$A = (-2)^2 \cdot (-3) + 2 \cdot 3^2 - 5^2 \cdot (-2) : 5 - 6 \quad B = (2 \cdot 5 - 3^2) + 2 \cdot (2^3 - 4) - 12 : (-3)$$

Λύση

Η προτεραιότητα των πράξεων

- Πρώτα υπολογίζουμε τις δυνάμεις.
- Στη συνέχεια κάνουμε τους πολλαπλασιασμούς και τις διαιρέσεις.
- Τέλος, κάνουμε τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις.
- Όταν η παράσταση περιέχει και παρενθέσεις, εκτελούμε πρώτα τις πράξεις μέσα στις παρενθέσεις με τη σειρά που αναφέραμε παραπάνω.

$$\begin{aligned} A &= (-2)^2 \cdot (-3) + 2 \cdot 3^2 - 5^2 \cdot (-2) : 5 - 6 = \\ &= 4 \cdot (-3) + 2 \cdot 9 - 25 \cdot (-2) : 5 - 6 = \\ &= -12 + 18 + 50 : 5 - 6 = \\ &= -12 + 18 + 10 - 6 = \\ &= 10 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= (2 \cdot 5 - 3^2) + 2 \cdot (2^3 - 4) - 12 : (-3) = \\ &= (2 \cdot 5 - 9) + 2 \cdot (8 - 4) - 12 : (-3) = \\ &= 10 - 9 + 2 \cdot 4 - 12 : (-3) = \\ &= 1 + 8 + 4 = \\ &= 9 + 4 = \\ &= 13 \end{aligned}$$



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

1 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με (Σ), αν είναι σωστές ή με (Λ), αν είναι λανθασμένες:

α) Για κάθε αριθμό a ισχύει $a + a + a + a = a^4$.

β) Για κάθε αριθμό a ισχύει $a \cdot a \cdot a \cdot a = a^4$.

γ) Οι αριθμοί $(-5)^6$ και -5^6 είναι αντίθετοι.

δ) Οι αριθμοί $\left(\frac{2}{3}\right)^8$ και $\left(\frac{3}{2}\right)^8$ είναι αντίστροφοι.

ε) Για κάθε αριθμό a ισχύει $(3a)^2 = 9a^2$.

στ) Ο αριθμός $-(-5)^2$ είναι θετικός.

ζ) Ο αριθμός -3^{-2} είναι θετικός.

2 Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά χρησιμοποιώντας το κατάλληλο σύμβολο ($=$ ή \neq).

α) $(-1)^6 \dots 1$ β) $3^{-2} \dots 9$ γ) $-4^2 \dots -16$ δ) $\left(\frac{5}{2}\right)^{-1} \dots \frac{2}{5}$

ε) $5^{-2} \dots \frac{1}{25}$ στ) $\left(\frac{2}{5}\right)^0 \dots 0$ ζ) $\left(-\frac{1}{2}\right)^5 \dots \frac{1}{32}$ η) $(7 + 2)^2 \dots 7^2 + 2^2$

3 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

ι) Η τιμή της παράστασης $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$ είναι:

α) $-\frac{4}{9}$ β) $-\frac{9}{4}$ γ) $\frac{9}{4}$ δ) $\frac{4}{9}$

ii) Η τιμή της παράστασης $[(-2)^0]^3$ είναι:

- α) -2^3 β) -6 γ) 2^3 δ) 1

iii) Η τιμή της παράστασης $2^3 + 3^2$ είναι:

- α) 5^5 β) 17 γ) 5^6 δ) 6^5

- 4 Να συμπληρώσετε τον πίνακα αντιστοιχίζοντας σε κάθε παράσταση της στήλης Α, το αποτέλεσμα της από τη στήλη Β.

Στήλη Α	Στήλη Β
α. $(2^4)^{-1}$	1. $\frac{1}{4}$
β. $(2^{-5})^2 \cdot 2^{10}$	2. -2^4
γ. $(-2)^{-2}$	3. 4
δ. $(2^4 : 2^3) \cdot 2^2$	4. 2^3
	5. 2^{-4}
	6. 1

α	β	γ	δ



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

- 1 Να γράψετε καθεμιά από τις παρακάτω παραστάσεις ως μία δύναμη:

- α) $2^{-5} \cdot 2^8$ β) $3^4 : 3^{-2}$ γ) $2^3 \cdot 5^3$ δ) $(5^{-2})^{-4}$
 ε) $3^{-2} \cdot (-3)^4$ στ) $\frac{(-6)^6}{2^6}$ ζ) $4^2 : 3^4$ η) $27 \cdot 3^4 \cdot \frac{1}{3^5}$

- 2 Να υπολογίσετε την τιμή κάθε παράστασης:

- α) $(2^{-2})^3 \cdot 2^8$ β) $(-3)^2 \cdot (-3)^{-4}$ γ) $(0,75)^{-2} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2$ δ) $36^3 : (-12)^3$
 ε) $(2,5)^4 \cdot (-4)^4$ στ) $4^{12} : 2^{20}$ ζ) $\left(-\frac{2}{3}\right)^{12} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{-14}$ η) $(0,01)^3 \cdot 10^5$

- 3 Να απλοποιήσετε τις παραστάσεις:

- α) $(x^2)^3 \cdot 5x^4$ β) $(xy^3)^2 \cdot x^3y$ γ) $(-2x)^2 \cdot (-2x^2)$
 δ) $\left(-\frac{2}{3}x\right)^3 : x^2$ ε) $(-3x^2)^3 \cdot (-2x^3)^2$ στ) $\frac{3}{-2}x^3 : \left(-\frac{3}{2}x\right)^2$

- 4 Να υπολογίσετε την τιμή κάθε παράστασης:

- A = $3 \cdot (-2)^2 + 4 - (-7)^0 \cdot 2 - 8 \cdot (2^{-1} - 1) - 2 \cdot 3^2$ B = $(-4)^2 : 2 - 5 - (-3) \cdot 2^2 - (-2)^4$
 Γ = $(2,5)^2 \cdot (1,25)^3 \cdot (-4)^2 \cdot (-8)^3$ Δ = $(25^7 \cdot 8^4) : (5^7 \cdot 40^4)$

- 5 Αν τριπλασιάσουμε την πλευρά ενός τετραγώνου, πόσες φορές μεγαλώνει το εμβαδόν του;

Γ Τετραγωνική ρίζα πραγματικού αριθμού



Η **τετραγωνική ρίζα** ενός θετικού αριθμού x συμβολίζεται με \sqrt{x} και είναι ο θετικός αριθμός που όταν υψωθεί στο τετράγωνο μας δίνει τον αριθμό x . Π.χ. $\sqrt{25} = 5$, αφού $5^2 = 25$. Ορίζουμε ακόμη $\sqrt{0} = 0$.

Όμως και $(-5)^2 = 25$, οπότε έχουμε $\sqrt{(-5)^2} = \sqrt{25} = 5 = |-5|$.

Άρα, για κάθε **πραγματικό αριθμό x** ισχύει:

$$\sqrt{x^2} = |x|$$

$$\sqrt{(-7)^2} = |-7| = 7, \quad \sqrt{7^2} = 7$$

Δεν ορίζεται τετραγωνική ρίζα αρνητικού αριθμού, γιατί δεν υπάρχει αριθμός που το τετράγωνό του να είναι αρνητικός αριθμός.

Παρατηρούμε ακόμη ότι: $(\sqrt{9})^2 = 3^2 = 9$, δηλαδή $(\sqrt{9})^2 = 9$. Γενικά

$$\text{Αν } x \geq 0, \text{ τότε } (\sqrt{x})^2 = x$$

Ιδιότητες των ριζών

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1. Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά χρησιμοποιώντας το κατάλληλο σύμβολο ($=$ ή \neq)

$$\sqrt{4} \cdot \sqrt{100} \dots \sqrt{4 \cdot 100} \quad \text{και} \quad \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{100}} \dots \sqrt{\frac{4}{100}}$$

2. Με τη βοήθεια ενός υπολογιστή τσέπης να συμπληρώσετε και τα παρακάτω κενά:

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt{5} \dots \sqrt{2 \cdot 5} \quad \text{και} \quad \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}} \dots \sqrt{\frac{2}{5}}$$

Για τους αριθμούς 4 και 100 μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε ότι ισχύουν:

$$\sqrt{4} \cdot \sqrt{100} = \sqrt{4 \cdot 100} \quad \text{και} \quad \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{100}} = \sqrt{\frac{4}{100}}$$

Με τη βοήθεια ενός υπολογιστή τσέπης μπορούμε να καταλήξουμε σε ανάλογες ισότητες και για τους αριθμούς 2 και 5. Όσα όμως παραδείγματα κι αν εξετάσουμε, δεν αρκούν για να μας πείσουν, ότι οι σχέσεις αυτές είναι αληθείς για οποιουδήποτε μη αρνητικούς αριθμούς. Μόνο μια απόδειξη μπορεί να μας πείσει.

Γενικά

Για δύο μη αρνητικούς αριθμούς a, β μπορούμε να αποδείξουμε ότι:

- Το γινόμενο των τετραγωνικών ριζών τους ισούται με την τετραγωνική ρίζα του γινομένου τους.

$$\sqrt{a} \cdot \sqrt{\beta} = \sqrt{a\beta}$$

- Το πηλίκο των τετραγωνικών ριζών τους ισούται με την τετραγωνική ρίζα του πηλίκου τους.

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{\beta}} = \sqrt{\frac{a}{\beta}} \quad \text{με } \beta > 0$$

Για να αποδείξουμε την πρώτη ισότητα, υπολογίζουμε το τετράγωνο κάθε μέλους της ξεχωριστά.

$$\bullet (\sqrt{a} \cdot \sqrt{b})^2 = (\sqrt{a})^2 \cdot (\sqrt{b})^2 = ab \quad \bullet (\sqrt{ab})^2 = ab$$

Παρατηρούμε, ότι οι δύο μη αρνητικοί αριθμοί $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ και \sqrt{ab} έχουν το ίδιο τετράγωνο ab , οπότε είναι ίσοι.

$$\text{Άρα } \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}.$$

Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να αποδείξουμε και τη δεύτερη ισότητα.

Παρατηρούμε ακόμη ότι $\sqrt{16} + \sqrt{9} = 4 + 3 = 7$, ενώ $\sqrt{16+9} = \sqrt{25} = 5$ δηλαδή $\sqrt{16} + \sqrt{9} \neq \sqrt{16+9}$.

Γενικά:

Αν a, b είναι θετικοί αριθμοί, τότε $\sqrt{a} + \sqrt{b} \neq \sqrt{a+b}$



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- 1** Να αποδειχθεί ότι $\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ και γενικά για μη αρνητικούς αριθμούς a, b ότι ισχύει $\sqrt{a^2b} = a\sqrt{b}$.

Λύση

Επειδή $20 = 4 \cdot 5 = 2^2 \cdot 5$ έχουμε $\sqrt{20} = \sqrt{2^2 \cdot 5} = \sqrt{2^2} \cdot \sqrt{5} = 2\sqrt{5}$.

Ομοίως έχουμε $\sqrt{a^2b} = \sqrt{a^2} \cdot \sqrt{b} = a\sqrt{b}$.

- Ο αριθμός 20 μπορεί να αναλυθεί και με άλλον τρόπο σε γινόμενο παραγόντων π.χ. $20 = 2 \cdot 10$, αλλά τότε κανένας παράγοντάς του δεν είναι τετράγωνο ενός θετικού ακέραιου αριθμού.

- 2** Να αποδειχθεί ότι:

$$\alpha) 3\sqrt{3} + 2\sqrt{3} = 5\sqrt{3} \quad \beta) \sqrt{3} \cdot \sqrt{24} = 6\sqrt{2} \quad \gamma) \sqrt{50} - \sqrt{18} = 2\sqrt{2}$$

Λύση

α) Με τη βοήθεια της επιμεριστικής ιδιότητας έχουμε:

$$3\sqrt{3} + 2\sqrt{3} = (3 + 2)\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$$

β) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{24} = \sqrt{3 \cdot 24} = \sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = \sqrt{36} \cdot \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$

γ) $\sqrt{50} - \sqrt{18} = \sqrt{25 \cdot 2} - \sqrt{9 \cdot 2} = \sqrt{25} \cdot \sqrt{2} - \sqrt{9} \cdot \sqrt{2} = 5\sqrt{2} - 3\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$

- 3** Να μετατραπεί το κλάσμα $\frac{5}{\sqrt{3}}$, που έχει άρρητο παρονομαστή, σε ισοδύναμο κλάσμα με ρητό παρονομαστή.

Λύση

Πολλαπλασιάζουμε και τους δύο όρους του κλάσματος με τον παρονομαστή.

$$\frac{5}{\sqrt{3}} = \frac{5 \cdot \sqrt{3}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} = \frac{5\sqrt{3}}{(\sqrt{3})^2} = \frac{5\sqrt{3}}{3}$$

4 Τα τετράγωνα ΑΒΓΔ και ΓΖΗΘ έχουν εμβαδόν 12 m^2 και 3 m^2 αντιστοίχως. Να βρεθεί το εμβαδόν του ορθογωνίου ΒΚΖΓ και το μήκος του τμήματος ΒΘ.

Λύση

Το εμβαδόν του τετραγώνου ΑΒΓΔ είναι $B\Gamma^2 = 12 \text{ m}^2$,
 οπότε η πλευρά του είναι $B\Gamma = \sqrt{12} \text{ m}$.


Το εμβαδόν του τετραγώνου ΓΖΗΘ είναι $\Gamma Z^2 = 3 \text{ m}^2$,
 οπότε η πλευρά του είναι $\Gamma Z = \sqrt{3} \text{ m}$. Επομένως

Το εμβαδόν του ορθογωνίου ΒΚΖΓ είναι:

$$E = B\Gamma \cdot \Gamma Z = \sqrt{12} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{12 \cdot 3} = \sqrt{36} = 6 \text{ m}^2.$$

Το μήκος του τμήματος ΒΘ είναι:

$$B\Theta = B\Gamma + \Gamma\Theta = B\Gamma + \Gamma Z = \sqrt{12} + \sqrt{3} = \sqrt{4 \cdot 3} + \sqrt{3} = 2\sqrt{3} + \sqrt{3} = 3\sqrt{3} \text{ m}.$$



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

- 1** Να συμπληρώσετε τις ισότητες:
 α) $3\sqrt{3} + \sqrt{3} = \dots$ β) $5\sqrt{2} - 3\sqrt{2} = \dots$ γ) $\sqrt{5} + 4\sqrt{5} - 5\sqrt{5} = \dots$
 δ) $\sqrt{12} \cdot \sqrt{3} = \dots$ ε) $\sqrt{18} : \sqrt{2} = \dots$ στ) $3\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} = \dots$

2 Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα αντιστοιχίζοντας σε κάθε στοιχείο της στήλης Α ένα στοιχείο από τη στήλη Β.

Στήλη Α	Στήλη Β
α. $\sqrt{25}$	1. -5 2. δεν ορίζεται 3. 5
β. $\sqrt{-25}$	
γ. $-\sqrt{25}$	
δ. $\sqrt{5^2}$	
ε. $\sqrt{(-5)^2}$	
στ. $\sqrt{-5^2}$	

α	β	γ	δ	ε	στ

3 Να συμπληρώσετε τους πίνακες:

Άθροισμα				Γινόμενο		Πηλίκο			
α	β	\sqrt{a}	\sqrt{b}	$\sqrt{a+b}$	$\sqrt{a} + \sqrt{b}$	$\sqrt{a\beta}$	$\sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$	$\sqrt{\frac{a}{\beta}}$	$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{\beta}}$
4	1								
9	16								
64	36								

4 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με (Σ), αν είναι σωστές ή με (Λ), αν είναι λανθασμένες.

α) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{6}$

β) $\sqrt{2} + \sqrt{3} = \sqrt{5}$

γ) $\sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{3}{2}$

δ) $\sqrt{(-3)^2} = 3$

ε) $\sqrt{\left(\frac{1}{2} - 1\right)^2} = \frac{1}{2} - 1$

στ) Το διπλάσιο του $\sqrt{5}$ είναι το $\sqrt{10}$.

ζ) Το μισό του $\sqrt{12}$ είναι το $\sqrt{3}$.

5 Ένα τετράγωνο έχει εμβαδόν 50 m^2 . Είναι σωστό να ισχυριστούμε ότι η πλευρά του είναι $5\sqrt{2} \text{ m}$;

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ



1 Να υπολογίσετε τις παραστάσεις:

α) $3\sqrt{5} - 7\sqrt{5} + 2\sqrt{5}$ β) $5\sqrt{7} - 8\sqrt{3} - 2\sqrt{7} + 4\sqrt{3}$

γ) $\sqrt{\frac{5}{2}} \cdot \sqrt{\frac{5}{8}} - \sqrt{\frac{3}{7}} \cdot \sqrt{\frac{12}{7}}$ δ) $\sqrt{\frac{14}{5}} \cdot \sqrt{\frac{10}{7}} + \sqrt{\frac{21}{2}} \cdot \sqrt{\frac{14}{3}}$

2 Να αποδείξετε τις ισότητες:

α) $3\sqrt{2} - \sqrt{50} + \sqrt{32} - 6\sqrt{8} = -10\sqrt{2}$ β) $\sqrt{27} - \sqrt{20} + \sqrt{12} - \sqrt{5} = 5\sqrt{3} - 3\sqrt{5}$

γ) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{18} - \sqrt{2} \cdot \sqrt{48} + \frac{\sqrt{120}}{\sqrt{5}} = \sqrt{6}$ δ) $\sqrt{3,6} \cdot \sqrt{4,9} - \sqrt{0,8} \cdot \sqrt{0,2} = 3,8$

3 Να υπολογίσετε τις παραστάσεις:

α) $\sqrt{12+\sqrt{16}}$ β) $\sqrt{86+2\sqrt{52-\sqrt{9}}}$ γ) $\sqrt{6\sqrt{12\sqrt{3\sqrt{9}}}}$

4 Να συμπληρώσετε τον πίνακα με τις περιμέτρους και τα εμβαδά των ορθογωνίων ΑΒΓΔ, ΕΖΗΘ και ΚΛΜΝ. Ποιο από τα ορθογώνια έχει το μεγαλύτερο εμβαδόν;

	μήκος	πλάτος	περίμετρος	εμβαδόν
ΑΒΓΔ	$5\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$		
ΕΖΗΘ	$4\sqrt{2}$	$2\sqrt{2}$		
ΚΛΜΝ	$3\sqrt{2}$	$3\sqrt{2}$		

5 Να κάνετε τις πράξεις:

α) $\sqrt{2} (\sqrt{18} + \sqrt{8})$

β) $\sqrt{6} (\sqrt{27} - \sqrt{3})$

γ) $(\sqrt{75} + \sqrt{45} - \sqrt{300}) : \sqrt{15}$

δ) $(\sqrt{7} - \sqrt{5})(\sqrt{7} + \sqrt{5})$

6 Να μετατρέψετε τα παρακάτω κλάσματα, που έχουν άρρητους παρονομαστές, σε ισοδύναμα κλάσματα με ρητούς παρονομαστές.

α) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

β) $\frac{4}{\sqrt{6}}$

γ) $\frac{5}{2\sqrt{5}}$

δ) $\frac{2\sqrt{3} + \sqrt{6}}{\sqrt{3}}$

7 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $\sqrt{5} + x = 3\sqrt{5} - x$


β) $\sqrt{6} x = \sqrt{24}$

γ) $\frac{x}{\sqrt{2}} = \sqrt{32}$

δ) $3\sqrt{3} - x = \sqrt{27}$

8 Να αποδείξετε ότι $(\sqrt{3} - 1)(\sqrt{3} + 1) = 2$. Χρησιμοποιώντας την προηγούμενη ισότητα να μετατρέψετε το κλάσμα $\frac{1}{\sqrt{3} - 1}$, που έχει άρρητο παρονομαστή, σε ισοδύναμο με ρητό παρονομαστή.

9 Αν τα τετράγωνα ΑΒΓΔ, ΓΕΖΗ έχουν εμβαδόν 50 m² και 8 m² αντιστοίχως, να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του τετραγώνου ΒΘΙΕ είναι 98 m².



10 Στις κάθετες πλευρές ΑΒ = 3 cm και ΑΓ = 6 cm ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ, να πάρετε αντιστοίχως τα σημεία Δ, Ε, έτσι ώστε ΑΔ = 2 cm και ΑΕ = 1 cm. Να αποδείξετε ότι ΒΓ = 3ΔΕ.


11 Στο ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ = ΑΓ), το ύψος ΑΔ = 4 cm και η πλευρά ΒΓ = 4 cm.

α) Να υπολογίσετε την πλευρά ΑΓ και στη συνέχεια να αποδείξετε ότι η περίμετρος του τριγώνου ΑΒΓ είναι $4 + 4\sqrt{5}$ cm.

β) Στην προηγούμενη ερώτηση 4 μαθητές έδωσαν τις παρακάτω απαντήσεις:

$4 + \sqrt{20}$, $4 + 2\sqrt{20}$, $8\sqrt{5}$, $2(2 + \sqrt{20})$.

Ποιες από αυτές είναι σωστές;



1.2

Μονώνυμα – Πράξεις με μονώνυμα





- ✓ Μαθαίνω τι είναι αλγεβρική παράσταση και πώς βρίσκεται η αριθμητική τιμή της.
- ✓ Διακρίνω αν μια αλγεβρική παράσταση είναι μονώνυμο και προσδιορίζω το βαθμό του.
- ✓ Μαθαίνω να κάνω πράξεις με μονώνυμα.



A Αλγεβρικές παραστάσεις - Μονώνυμα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ



1. Να βρείτε την περίμετρο και το εμβαδόν των κίτρινων σχημάτων.
2. Στο πράσινο σχήμα φαίνεται η κάτοψη ενός καταστήματος που πρόκειται να στρωθεί με πλακάκια. Να εξηγήσετε γιατί τα πλακάκια που θα χρειαστούν έχουν συνολικό εμβαδόν $2x^2 + xy$. Αν $x = 5$ και $y = 8$, ποιο είναι το συνολικό εμβαδόν τους;

Αλγεβρικές παραστάσεις

Πολλές φορές για να λύσουμε ένα πρόβλημα, καταλήγουμε σε εκφράσεις που περιέχουν μόνο αριθμούς και γι' αυτό ονομάζονται **αριθμητικές παραστάσεις**.

$$6 \cdot 5 + 2 \cdot 8, \quad 2 \cdot 5^2 + 5 \cdot 8$$

Υπάρχουν όμως και προβλήματα στα οποία καταλήγουμε σε εκφράσεις οι οποίες, εκτός από αριθμούς, περιέχουν και μεταβλητές. Οι εκφράσεις αυτές λέγονται **αλγεβρικές παραστάσεις**.

$$4x, \quad 2a + 2b, \quad x^2, \quad ab, \\ \frac{2x}{y^3}, \quad 2x^2 + xy$$

Ειδικότερα μια αλγεβρική παράσταση λέγεται **ακέραια**, όταν μεταξύ των μεταβλητών της σημειώνονται μόνο οι πράξεις της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού και οι εκθέτες των μεταβλητών της είναι φυσικοί αριθμοί.

$$2x + 3x^2, \quad \frac{1}{2}a + b^2, \quad \frac{4}{3}\pi R^3$$

Αν σε μια αλγεβρική παράσταση αντικαταστήσουμε τις μεταβλητές με αριθμούς και κάνουμε τις πράξεις, θα προκύψει ένας αριθμός που λέγεται **αριθμητική τιμή** ή απλά **τιμή** της αλγεβρικής παράστασης.

Για παράδειγμα, η τιμή της αλγεβρικής παράστασης $2x^2 + xy$ για $x = 5$ και $y = 8$, είναι $2 \cdot 5^2 + 5 \cdot 8 = 90$.

Μονώνυμα

Οι ακέραιες αλγεβρικές παραστάσεις, στις οποίες μεταξύ των μεταβλητών σημειώνεται μόνο η πράξη του πολλαπλασιασμού, λέγονται **μονώνυμα**.

Σ' ένα μονώνυμο ο αριθμητικός παράγοντας λέγεται **συντελεστής** του μονωνύμου, ενώ το γινόμενο όλων των μεταβλητών του με τους αντίστοιχους εκθέτες τους λέγεται **κύριο μέρος** του μονωνύμου.

Ο εκθέτης μιας μεταβλητής λέγεται **βαθμός** του μονωνύμου ως προς τη μεταβλητή αυτή, ενώ ο **βαθμός** του μονωνύμου ως προς όλες τις μεταβλητές του λέγεται το άθροισμα των εκθετών των μεταβλητών του.

$$4x, x^2, \frac{2}{3}ab, \sqrt{2}x^4y^2w^3$$



Το μονώνυμο $2x^3y$ είναι:
 3^ο βαθμού ως προς x
 1^ο βαθμού ως προς y
 4^ο βαθμού ως προς x και y

Τα μονώνυμα που έχουν το ίδιο κύριο μέρος λέγονται **όμοια**.

Για παράδειγμα τα μονώνυμα $\frac{2}{5}x^3y\omega^2$, $-5x^3y\omega^2$, $x^3y\omega^2$, είναι όμοια.

Τα όμοια μονώνυμα που έχουν τον ίδιο συντελεστή λέγονται **ίσα** ενώ, αν έχουν αντίθετους συντελεστές, λέγονται **αντίθετα**.

Για παράδειγμα τα μονώνυμα $2x^3y$ και $-2x^3y$ είναι αντίθετα.

Συμφωνούμε ακόμη να θεωρούνται και οι αριθμοί ως μονώνυμα και τα ονομάζουμε **σταθερά** μονώνυμα. Ειδικότερα, ο αριθμός 0 λέγεται **μηδενικό μονώνυμο** και δεν έχει βαθμό, ενώ όλα τα άλλα σταθερά μονώνυμα είναι μηδενικού βαθμού. Για παράδειγμα, ο αριθμός 5 είναι σταθερό μονώνυμο μηδενικού βαθμού.



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1 Να βρεθεί η αριθμητική τιμή των παραστάσεων

α) $-3x^2y^3$, για $x = -2$ και $y = -1$ β) $2a^2 - 3b + 6$ για $a = -3$ και $b = 8$.

Λύση

α) Η αριθμητική τιμή της παράστασης $-3x^2y^3$ για $x = -2$ και $y = -1$ είναι:
 $-3 \cdot (-2)^2 \cdot (-1)^3 = -3 \cdot (+4) \cdot (-1) = 12$.

β) Η αριθμητική τιμή της παράστασης $2a^2 - 3b + 6$ για $a = -3$ και $b = 8$ είναι:
 $2 \cdot (-3)^2 - 3 \cdot 8 + 6 = 2 \cdot (+9) - 24 + 6 = 18 - 24 + 6 = 0$.


- 2** Το ιδανικό βάρος B (σε κιλά) ενός ενήλικα, ύψους u (σε cm) δίνεται από τον τύπο $B = \kappa \left(u - 100 + \frac{t}{10} \right)$, όπου t είναι η ηλικία του (σε έτη) και κ μια σταθερά (για τον άνδρα $\kappa = 0,9$ και για τη γυναίκα $\kappa = 0,8$). Να βρεθεί ποιο είναι το ιδανικό βάρος για έναν άνδρα και μια γυναίκα, από τους οποίους ο καθένας είναι 30 ετών και έχει ύψος 1,77 m.

Λύση

Το ιδανικό βάρος B (σε κιλά) ενός άνδρα ηλικίας 30 ετών και ύψους 1,77 m = 177 cm, είναι $B = 0,9 \cdot \left(177 - 100 + \frac{30}{10} \right) = 0,9 \cdot (177 - 100 + 3) = 0,9 \cdot 80 = 72$ κιλά.

Το ιδανικό βάρος B (σε κιλά) μιας γυναίκας ηλικίας 30 ετών και ύψους 1,77 m = 177 cm, είναι $B = 0,8 \cdot \left(177 - 100 + \frac{30}{10} \right) = 0,8 \cdot (177 - 100 + 3) = 0,8 \cdot 80 = 64$ κιλά.

- 3** Να βρεθεί το μονώνυμο που εκφράζει το εμβαδόν του χρωματισμένου μέρους, το οποίο περιέχεται μεταξύ του τετραγώνου και του κύκλου. Να προσδιοριστεί ο συντελεστής του, το κύριο μέρος του και ο βαθμός του. Να υπολογιστεί η αριθμητική τιμή του για $\rho = 10$ cm.

**Λύση**

Το τετράγωνο έχει πλευρά 2ρ , οπότε το εμβαδόν του είναι $(2\rho)^2 = 4\rho^2$. Επειδή το εμβαδόν του κύκλου είναι $\pi\rho^2$, το χρωματισμένο μέρος έχει εμβαδόν $4\rho^2 - \pi\rho^2$. Με την επιμεριστική ιδιότητα η παράσταση $4\rho^2 - \pi\rho^2$ γράφεται

$$4\rho^2 - \pi\rho^2 = (4 - \pi)\rho^2 = (4 - 3,14)\rho^2 = 0,86\rho^2$$

Άρα είναι μονώνυμο δευτέρου βαθμού με συντελεστή 0,86 και κύριο μέρος ρ^2 . Η αριθμητική τιμή του για $\rho = 10$ cm είναι $0,86 \cdot 10^2 = 0,86 \cdot 100 = 86$ cm².

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ




- 1** Ποιες από τις παρακάτω αλγεβρικές παραστάσεις είναι μονώνυμα;
 α) $-3x^2y$ β) $3 + x^2y$ γ) $\frac{x^3y}{\omega^2}$ δ) $2x^2y\omega^3$ ε) $(3 - \sqrt{2})\alpha\beta^3$ στ) $\frac{2}{3}\alpha\beta\gamma^3$
- 2** Ποια από τα παρακάτω μονώνυμα είναι όμοια:
 α) $6x^2y^2$ β) $-\frac{3}{5}xy^3$ γ) $-x^3y\omega$ δ) $-5y^3x$ ε) $\frac{\omega y x^3}{4}$ στ) $\frac{5}{2}y^2x^2$
 ζ) $\frac{xy^3}{7}$ η) $-x^2y^2$ θ) $yx^3\omega$ ι) $\sqrt{2}xy^3$

3 Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:

Μονώνυμο	Συντελεστής	Κύριο μέρος	Βαθμός ως προς x	Βαθμός ως προς y	Βαθμός ως προς x και y
$5xy^4$					
$-xy^2$					
$\frac{1}{7}x^2y^5$					
$-\sqrt{3}x^4$					

4 Ένα μονώνυμο έχει συντελεστή $-\frac{1}{3}$ και κύριο μέρος $xy^2\omega^3$. Να βρείτε το ίσο του και το αντίθετο μονώνυμό του.

5 Να λύσετε το σταυρόλεξο.



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

- Έκφραση που περιέχει αριθμούς και μεταβλητές συνδεόμενες με τα σύμβολα των πράξεων (δύο λέξεις).
- Είναι τα μονώνυμα 8, -5, 0, 3.
- Είναι ο βαθμός του μονωνύμου $3x^2\omega$ ως προς y.
- Στο μονώνυμο $-2x^2y$ είναι το -2.
- Είναι τα μονώνυμα $-\frac{6}{2}x^3y$, $-3x^3y$.
- Ο συντελεστής του μονωνύμου xy.
- Είναι το $x\omega^2$ στο μονώνυμο $4x\omega^2$ (δύο λέξεις).
- Η απλούστερη αλγεβρική παράσταση.

ΚΑΘΕΤΑ


- Το μονώνυμο αυτό δεν έχει βαθμό.
- Στο μονώνυμο $7x^4y\omega^5$ ως προς x είναι 4.
- Παράσταση που μεταξύ των μεταβλητών της σημειώνονται μόνο οι πράξεις της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού.
- Είναι τα μονώνυμα $5xy^2$, $-\sqrt{25}xy^2$.
- Είναι τα μονώνυμα $4a^2\beta^5$, $-a^2\beta^5$.
- Η του μονωνύμου $-2x^2y$ για $x = 2$ και $y = -1$ είναι 8.
- Είναι ο βαθμός των σταθερών μονωνύμων 6, -3, 7.
- Η πράξη αυτή δε σημειώνεται μεταξύ των μεταβλητών ενός μονωνύμου.




ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

- 1 Να βρείτε την αριθμητική τιμή των αλγεβρικών παραστάσεων:
 - α) $-2xy^3 + x^2y - 4$ για $x = -2$ και $y = 1$
 - β) $\frac{2}{3}x\omega^2 + \frac{1}{2}\omega^3$ για $x = 3$ και $\omega = -2$
- 2 Ένα μονώνυμο έχει συντελεστή $-\frac{5}{7}$ και μεταβλητές α, β . Να προσδιορίσετε το μονώνυμο, αν ο βαθμός του ως προς α είναι 2 και ως προς β είναι 5.
- 3 Να προσδιορίσετε την τιμή του φυσικού αριθμού n , ώστε το μονώνυμο $3x^ny^2$
 - α) να είναι μηδενικού βαθμού ως προς x
 - β) να είναι πέμπτου βαθμού ως προς x και y
 - γ) να έχει αριθμητική τιμή 48, για $x = 2$ και $y = -1$.
- 4 Να βρείτε τους αριθμούς k, λ, n , ώστε τα μονώνυμα $4x^3y^n, \lambda x^ky^2$ να είναι:
 - α) όμοια
 - β) ίσα
 - γ) αντίθετα


- 5 Να γράψετε τα μονώνυμα που εκφράζουν το εμβαδόν και τον όγκο μιας σφαίρας που έχει ακτίνα ρ . Να προσδιορίσετε το συντελεστή, το κύριο μέρος και το βαθμό κάθε μονωνύμου. Ποια είναι η αριθμητική τιμή κάθε μονωνύμου, όταν $\rho = 10$;



- 6 Μια ομάδα καλαθοσφαίρισης έδωσε 9 αγώνες. Να γράψετε μια αλγεβρική παράσταση που εκφράζει τους βαθμούς που συγκέντρωσε, αν σε κάθε νίκη παίρνει 2 βαθμούς και σε κάθε ήττα 1 βαθμό.



- 7 Να γράψετε την αλγεβρική παράσταση που εκφράζει το εμβαδόν του τετραγώνου ΒΓΔΕ. Ποιο είναι το εμβαδόν, όταν $x = 12$;



B Πράξεις με μονώνυμα

Οι μεταβλητές ενός μονωνύμου αντιπροσωπεύουν αριθμούς και γι' αυτό στις πράξεις που γίνονται μεταξύ μονωνύμων ισχύουν όλες οι ιδιότητες των πράξεων που ισχύουν και στους αριθμούς.

Πρόσθεση μονωνύμων

Ένα άθροισμα ομοίων μονωνύμων π.χ. $-5x^3 + 2x^3$ με τη βοήθεια της επιμεριστικής ιδιότητας γράφεται

$$-5x^3 + 2x^3 = (-5 + 2)x^3 = -3x^3$$

Παρατηρούμε ότι:

Το άθροισμα ομοίων μονωνύμων είναι μονώνυμο όμοιο με αυτά και έχει συντελεστή το άθροισμα των συντελεστών τους.

Σύμφωνα με τον προηγούμενο κανόνα, έχουμε $-12x^2y - 3x^2y = -15x^2y$.

Αν τα μονώνυμα δεν είναι όμοια, όπως τα $3x$ και $5y$, τότε το άθροισμά τους $3x + 5y$ δεν είναι μονώνυμο.

Πολλαπλασιασμός μονωνύμων

Ένα γινόμενο μονωνύμων π.χ. $(-2x)(3x^2y)$ με τη βοήθεια των ιδιοτήτων του πολλαπλασιασμού και των δυνάμεων γράφεται

$$(-2x)(3x^2y) = (-2)x \cdot 3x^2y = (-2) \cdot 3(xx^2)y = -6x^3y.$$

Παρατηρούμε ότι:

Το γινόμενο μονωνύμων είναι μονώνυμο με:

- **συντελεστή** το γινόμενο των συντελεστών τους και
- **κύριο μέρος** το γινόμενο όλων των μεταβλητών τους με εκθέτη κάθε μεταβλητής το άθροισμα των εκθετών της.

Σύμφωνα με τον προηγούμενο κανόνα έχουμε $(-3x^4y^3\omega)\left(\frac{2}{5}x\omega^3\right) = -\frac{6}{5}x^5y^3\omega^4$.

Διαίρεση μονωνύμων

Η διαίρεση μονωνύμων, όπως και η διαίρεση αριθμών γίνεται, αν πολλαπλασιάσουμε το διαιρετέο με τον αντίστροφο του διαιρέτη.

Για παράδειγμα,

$$(-12x^4y\omega^2) : (4x^2y\omega) = -12x^4y\omega^2 \cdot \frac{1}{4x^2y\omega} = \frac{-12x^4y\omega^2}{4x^2y\omega} = -\frac{12}{4} \cdot \frac{x^4}{x^2} \cdot \frac{y}{y} \cdot \frac{\omega^2}{\omega} = -3x^2\omega.$$

$$\text{Ομοίως έχουμε: } (7xy^4) : (-x^3y) = \frac{7xy^4}{-x^3y} = -\frac{7y^3}{x^2}$$

Παρατηρούμε ότι στο πρώτο παράδειγμα το πηλίκο των μονωνύμων είναι μονώνυμο, ενώ στο δεύτερο παράδειγμα δεν είναι μονώνυμο.



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1 Να γίνουν οι πράξεις:

$$\alpha) -7ax^2 - \frac{1}{2}ax^2 + 4ax^2 \quad \beta) \left(-\frac{2}{3}xy^2\right) \cdot \left(-\frac{1}{4}x^3y^2\right) \quad \gamma) \left(\frac{3}{4}a^3b\right) : \left(-\frac{1}{2}ab^3\right)$$


Λύση

$$\alpha) -7ax^2 - \frac{1}{2}ax^2 + 4ax^2 = \left(-7 - \frac{1}{2} + 4\right)ax^2 = \left(-\frac{14}{2} - \frac{1}{2} + \frac{8}{2}\right)ax^2 = -\frac{7}{2}ax^2$$

$$\beta) \left(-\frac{2}{3}xy^2\right) \cdot \left(-\frac{1}{4}x^3y^2\right) = \frac{2}{12}x^4y^4 = \frac{1}{6}x^4y^4$$

$$\gamma) \left(\frac{3}{4}a^3b\right) : \left(-\frac{1}{2}ab^3\right) = \frac{3a^3b}{4} : \left(-\frac{ab^3}{2}\right) = \frac{3a^3b}{4} \cdot \left(-\frac{2}{ab^3}\right) = -\frac{6a^3b}{4ab^3} = -\frac{3a^2}{2b^2}$$

2 Από το σημείο A αφήνουμε ένα σώμα να πέσει στο έδαφος. Αν ο χρόνος t σε sec που μεσολαβεί μέχρι να φτάσει στο έδαφος είναι διπλάσιος του χρόνου που θα έκανε, αν το αφήναμε να πέσει από το σημείο B, να βρεθεί το μονώνυμο που εκφράζει την απόσταση AB.



Λύση

Από τη Φυσική γνωρίζουμε ότι η απόσταση AE δίνεται από τον τύπο $AE = \frac{1}{2}gt^2$, όπου $g = 10 \text{ m/sec}^2$ περίπου. Άρα $AE = 5t^2$.

Αν αφήναμε το σώμα να πέσει από το σημείο B, τότε θα έφτανε στο έδαφος σε χρόνο $\frac{t}{2}$ sec και θα ήταν

$$BE = \frac{1}{2} \cdot g \cdot \left(\frac{t}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot \frac{t^2}{4} = \frac{5}{4}t^2.$$


$$\text{Η απόσταση AB είναι } AB = AE - BE = 5t^2 - \frac{5}{4}t^2 = \frac{20}{4}t^2 - \frac{5}{4}t^2 = \frac{15}{4}t^2.$$

3 Μια τσιμεντένια κυλινδρική κολώνα, που έχει ακτίνα βάσης ρ και ύψος u , ενισχύεται περιμετρικά με τσιμέντο και αποκτά ακτίνα βάσης διπλάσια της αρχικής. Ο μηχανικός ισχυρίζεται ότι το τσιμέντο που προστέθηκε έχει όγκο τριπλάσιο του αρχικού όγκου της κολώνας. Είναι σωστός ο ισχυρισμός του;

Λύση

Ο αρχικός όγκος της κολώνας ήταν $V_1 = \pi\rho^2u$.

Μετά την ενίσχυση της κολώνας, ο συνολικός όγκος της έγινε $V_2 = \pi(2\rho)^2u = \pi(4\rho^2)u = 4\pi\rho^2u$. Άρα το τσιμέντο που προστέθηκε έχει όγκο $V_2 - V_1 = 4\pi\rho^2u - \pi\rho^2u = 3\pi\rho^2u$, που είναι πράγματι τριπλάσιος του αρχικού όγκου $\pi\rho^2u$ της κολώνας. Επομένως ο ισχυρισμός του μηχανικού είναι σωστός.





ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

1 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με (Σ), αν είναι σωστές ή με (Λ) αν είναι λανθασμένες.

- α) Το άθροισμα ομοίων μονωνύμων είναι μονώνυμο.
 β) Η διαφορά δύο μονωνύμων είναι μονώνυμο.
 γ) Το γινόμενο μονωνύμων είναι μονώνυμο.
 δ) Το πηλίκο δύο μονωνύμων είναι μονώνυμο.

2 Να συμπληρώσετε τις ισότητες:

- α) $-5x^2 + 2x^2 = \dots\dots\dots$ β) $-5x^2 \cdot 2x^3 = \dots\dots\dots$ γ) $3x - 2y + 2x = \dots\dots\dots$
 δ) $4x^2y - yx^2 = \dots\dots\dots$ ε) $2xy \cdot y^2 = \dots\dots\dots$ στ) $6x^3y : 3xy = \dots\dots\dots$
 ζ) $5x^4\omega^3 (\dots) = -10x^6\omega^4$ η) $\frac{-12x^3y}{\dots\dots\dots} = \frac{4x^2}{y}$ θ) $3x^2y - \dots\dots = -4x^2y$



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

1 Να κάνετε τις πράξεις:

- α) $-7x^2y + 4x^2y$ β) $4ax^2 - 6ax^2 + ax^2$ γ) $6x^3 - \frac{9}{2}x^3$
 δ) $0,25a\beta - 0,35a\beta + 0,5a\beta$ ε) $\frac{2}{5}xy^2\omega^4 - 1,2xy^2\omega^4$ στ) $-3\sqrt{2}x^2 + 4\sqrt{2}x^2 - \sqrt{2}x^2$

2 Να υπολογίσετε τα γινόμενα:

- α) $-3x \cdot 5x^2$ β) $6x^2 \cdot \frac{3}{4}x^3$ γ) $2xy^3 \cdot (-3x^2y)$ δ) $-3x^2y \cdot (-2xy^4\omega)$
 ε) $-\frac{1}{3}a\beta^3 \cdot 4a\beta^3$ στ) $\frac{4}{3}x^3a^2 \cdot (-\frac{1}{4}xa^3)$ ζ) $(-\frac{2}{5}xy^3) \cdot (-3x^2\omega) \cdot (-\frac{5}{6}y\omega^3)$


3 Να υπολογίσετε τα πηλίκα:

- α) $12a^3 : (-3a)$ β) $8x^2y : (2xy^2)$ γ) $(-\frac{1}{3}a^3\beta^5) : (\frac{6}{5}a^2\beta^2)$
 δ) $(0,84x^2\omega^5) : (-0,12x\omega^3)$ ε) $(-x^3a^4\omega) : (-\frac{1}{4}x^2a)$ στ) $(0,5a^3\beta^7) : (-\frac{7}{10}a^2\beta^2)$


4 Να κάνετε τις πράξεις:

- α) $(-\frac{1}{3}x^2y)^2 \cdot (6xy^3)$ β) $(-2x^2y^3)^3 : (-8x^3y^4)$ γ) $(-2xy^4\omega^3)^2 \cdot (-x^2y)^3$

5 Να βρείτε το εμβαδόν των παρακάτω σχημάτων. Ποιες από τις εκφράσεις που βρήκατε είναι μονώνυμα;



6 Να συγκρίνετε το εμβαδόν του πράσινου τριγώνου με το άθροισμα των εμβαδών των κίτρινων τριγώνων.



1.3 Πολυώνυμα – Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων



- ✓ Μαθαίνω τι είναι πολυώνυμο, ποιος είναι ο βαθμός ενός πολυωνύμου και διακρίνω αν δύο πολυώνυμα είναι ίσα.
- ✓ Μαθαίνω να προσθέτω και να αφαιρώ πολυώνυμα.



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1. Να γράψετε τρία όμοια μονώνυμα με δύο μεταβλητές και να βρείτε το άθροισμά τους.
2. Να γράψετε τρία μονώνυμα με δύο μεταβλητές που δεν είναι όμοια. Μπορείτε τώρα να βρείτε ένα μονώνυμο ίσο με το άθροισμά τους;
3. Να βρείτε το βαθμό κάθε μονωνύμου της προηγούμενης ερώτησης, ως προς κάθε μεταβλητή και ως προς τις δύο μεταβλητές.

Πολυώνυμα

Στην προηγούμενη ενότητα είδαμε, ότι το άθροισμα ομοίων μονωνύμων είναι μονώνυμο όμοιο με αυτά. Αν δύο τουλάχιστον μονώνυμα δεν είναι όμοια, τότε το άθροισμά τους δεν είναι μονώνυμο αλλά μια αλγεβρική παράσταση, που λέγεται **πολυώνυμο**. π.χ.

$$3x^2y + 2xy^4 - 5x^3y^3$$

Κάθε μονώνυμο που περιέχεται σε ένα πολυώνυμο λέγεται **όρος** του πολυωνύμου.

Το πολυώνυμο $3x^2y + 2xy^4 - 5x^3y^3$ έχει τρεις όρους που είναι τα μονώνυμα $3x^2y$, $2xy^4$, $-5x^3y^3$.

Ειδικότερα, ένα πολυώνυμο που δεν έχει όμοιους όρους λέγεται

- διώνυμο, αν έχει δύο όρους
- τριώνυμο, αν έχει τρεις όρους.

$$3a^2 - 2b$$
$$2x^2 - 3x + 4$$

Βαθμός ενός πολυωνύμου ως προς μία ή περισσότερες μεταβλητές του, είναι ο μεγαλύτερος από τους βαθμούς των όρων του.

Το πολυώνυμο $3x^2y + 2xy^4 - 5x^3y^3$ είναι 3ου βαθμού ως προς x , 4ου βαθμού ως προς y , 6ου βαθμού ως προς x και y .

Συμφωνούμε, ακόμα, ότι κάθε αριθμός μπορεί να θεωρηθεί και ως πολυώνυμο, οπότε λέγεται **σταθερό** πολυώνυμο. Ειδικότερα, ο αριθμός μηδέν λέγεται **μηδενικό** πολυώνυμο και δεν έχει βαθμό, ενώ κάθε άλλο σταθερό πολυώνυμο είναι μηδενικού βαθμού.

Το πολυώνυμο $-3x + 2x^2 + 5$ έχει μία μεταβλητή την x και για συντομία συμβολίζεται $P(x)$ ή $Q(x)$ ή $A(x)$ κ.τ.λ.

Το πολυώνυμο $P(x) = -3x + 2x^2 + 5$ είναι δευτέρου βαθμού και μπορούμε να το γράψουμε έτσι, ώστε κάθε όρος του να είναι μεγαλύτερου βαθμού από τον επόμενο του.

$$\text{Δηλαδή, } P(x) = 2x^2 - 3x + 5.$$

Τότε, λέμε, ότι γράφουμε το πολυώνυμο **κατά τις φθίνουσες δυνάμεις του x** .

Η αριθμητική τιμή του πολυώνυμου $P(x)$ για $x = 5$, συμβολίζεται με $P(5)$ και είναι:

$$P(5) = 2 \cdot 5^2 - 3 \cdot 5 + 5 = 50 - 15 + 5 = 40.$$

Δύο πολυώνυμα είναι **ίσα**, όταν έχουν όρους ίσα μονώνυμα.

Τα πολυώνυμα $3x^2 - 5x + 1$ και $ax^2 + \beta x + 1$ είναι ίσα, αν $a = 3$ και $\beta = -5$.

Αναγωγή ομοίων όρων

Αν σε ένα πολυώνυμο υπάρχουν όμοια μονώνυμα, ή όπως λέμε όμοιοι όροι, τότε μπορούμε να τους αντικαταστήσουμε με το άθροισμά τους. Η εργασία αυτή λέγεται **αναγωγή ομοίων όρων**.

$$\begin{aligned} 2a^2 - 3\beta + 4a^2 - 5\beta &= \\ 2a^2 + 4a^2 - 3\beta - 5\beta &= 6a^2 - 8\beta \end{aligned}$$

Η αρχική αλγεβρική παράσταση, που είχε τέσσερις όρους, συμπύχθηκε σε μία άλλη με δύο όρους.

Πρόσθεση – Αφαίρεση πολυωνύμων

Μπορούμε να προσθέτουμε ή να αφαιρούμε πολυώνυμα χρησιμοποιώντας τις γνωστές ιδιότητες των πραγματικών αριθμών.

Για παράδειγμα, τα πολυώνυμα $A(x) = 3x^3 - 2x^2 - 7x - 5$ και $B(x) = 2x^3 - x^2 + x$ έχουν άθροισμα ή διαφορά που βρίσκουμε ως εξής:

$$\begin{aligned} A(x) + B(x) &= (3x^3 - 2x^2 - 7x - 5) + (2x^3 - x^2 + x) = \text{(Απαλείφουμε τις παρενθέσεις)} \\ &= 3x^3 - 2x^2 - 7x - 5 + 2x^3 - x^2 + x = \text{(Κάνουμε αναγωγή ομοίων όρων)} \\ &= 5x^3 - 3x^2 - 6x - 5. \end{aligned}$$

Ομοίως, έχουμε:

$$\begin{aligned} A(x) - B(x) &= (3x^3 - 2x^2 - 7x - 5) - (2x^3 - x^2 + x) = \\ &= 3x^3 - 2x^2 - 7x - 5 - 2x^3 + x^2 - x = \\ &= x^3 - x^2 - 8x - 5. \end{aligned}$$



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- 1 α) Να γραφεί το πολυώνυμο $P(x) = 4x^2 - 8x + ax^3 - 5$ κατά τις φθίνουσες δυνάμεις του x και να βρεθεί ο βαθμός του.
- β) Αν το $P(x)$ είναι ίσο με το πολυώνυμο $Q(x) = \beta x^2 + \gamma x + \delta$, ποιες είναι οι τιμές των a, β, γ, δ ;

Λύση

α) Το πολυώνυμο $P(x) = 4x^2 - 8x + ax^3 - 5$, κατά τις φθίνουσες δυνάμεις του x γράφεται $P(x) = ax^3 + 4x^2 - 8x - 5$. Το $P(x)$ είναι τρίτου βαθμού, αν $a \neq 0$ και δευτέρου βαθμού, αν $a = 0$.

β) Τα πολυώνυμα $P(x) = ax^3 + 4x^2 - 8x - 5$ και $Q(x) = \beta x^2 + \gamma x + \delta$ είναι ίσα, αν $a = 0$, $\beta = 4$, $\gamma = -8$ και $\delta = -5$.

- 2** Μια βιοτεχνία ρούχων για να κατασκευάσει x πουκάμισα ξοδεύει ημερησίως 500 € για μισθούς υπαλλήλων, 10 € για τα υλικά που απαιτεί κάθε πουκάμισο (ύφασμα, κλωστές, ...) και $\frac{1}{10}x^2$ € για τα υπόλοιπα έξοδά της (μεταφορικά, ηλεκτρικό ρεύμα ...). Πόσα ξοδεύει ημερησίως για την κατασκευή x πουκαμίσων; Ποια θα είναι τα έξοδα της βιοτεχνίας, αν κατασκευάσει 50 πουκάμισα;

Λύση

Τα έξοδα των υλικών για την κατασκευή ενός πουκάμισου είναι 10 €, οπότε για τα x πουκάμισα τα έξοδα των υλικών θα είναι $10x$ €. Το συνολικό ποσό σε €, που ξοδεύει ημερησίως η βιοτεχνία είναι $P(x) = \frac{1}{10}x^2 + 10x + 500$

Για την κατασκευή 50 πουκαμίσων τα έξοδα είναι:

$$P(50) = \frac{1}{10} 50^2 + 10 \cdot 50 + 500 = \frac{1}{10} 2500 + 500 + 500 = 1250 \text{ €}$$

- 3** Αν $P(x) = x^2 - 3x + 4$, να προσδιοριστεί το πολυώνυμο $Q(x) = P(2x) - P(-x)$.

Λύση

Το πολυώνυμο $P(2x)$ προκύπτει, αν στο $P(x)$ θέσουμε, όπου x το $2x$, οπότε έχουμε:

$$P(2x) = (2x)^2 - 3(2x) + 4 = 4x^2 - 6x + 4$$

Το πολυώνυμο $P(-x)$ προκύπτει, αν στο $P(x)$ θέσουμε, όπου x το $-x$, οπότε έχουμε:

$$P(-x) = (-x)^2 - 3(-x) + 4 = x^2 + 3x + 4. \text{ Άρα:}$$

$$\begin{aligned} Q(x) &= P(2x) - P(-x) = (4x^2 - 6x + 4) - (x^2 + 3x + 4) = \\ &= 4x^2 - 6x + 4 - x^2 - 3x - 4 = 3x^2 - 9x \end{aligned}$$

**ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ**

- 1** Ποιες από τις παρακάτω αλγεβρικές παραστάσεις είναι πολυώνυμα;

α) $4x^3 - 5x^2 + 2x - \frac{1}{x}$

β) $3x^4 - 7x^2 - 12$

γ) $\sqrt{2}x^2y - 5xy + y^2 + \frac{1}{3}$

δ) $x^3 + 2x^2y - \sqrt{x}y^2 + 3y^3$

- 2** Ποια από τα παρακάτω πολυώνυμα είναι 2ου βαθμού ως προς x ;

α) $7 - 3x - 2x^2$

β) $3x^2 - 5x - 3x^2 + 10$

γ) $4x^3 + x^2 - 3x^3 + 2x - x^3 + 6$

δ) $2xy - 3y + 9$

- 3 Ένας μαθητής θέλοντας να υπολογίσει το άθροισμα και τη διαφορά των πολυωνύμων $4x^3 - 8x^2 + x + 7$ και $x^3 - 6x + 2$ έγραψε

$$\begin{array}{r} \text{Άθροισμα} \\ 4x^3 - 8x^2 + x + 7 \\ + \quad x^3 \quad - 6x + 2 \\ \hline 5x^3 - 8x^2 - 5x + 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{Διαφορά} \\ 4x^3 - 8x^2 + x + 7 \\ + \quad -x^3 \quad + 6x - 2 \\ \hline 3x^3 - 8x^2 + 7x + 5 \end{array}$$

Είναι σωστός ο τρόπος που εφάρμοσε; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας.


- 4 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
 Το πολυώνυμο που πρέπει να προσθέσουμε στο $2x^2 + 5x + 7$ για να βρούμε άθροισμα $8x^2 + 4x - 5$ είναι το:
 α) $6x^2 + x - 2$ β) $10x^2 + 9x + 2$ γ) $6x^2 - x - 12$ δ) $-6x^2 + x + 12$.

- 5 Τα πολυώνυμα $A(x)$, $B(x)$ και $\Gamma(x)$ έχουν βαθμούς 2, 3 και 2 αντιστοίχως.
 α) Να βρείτε το βαθμό του πολυώνυμου $A(x) + B(x)$.
 β) Αν το πολυώνυμο $A(x) + \Gamma(x)$ δεν είναι το μηδενικό, τι βαθμό μπορεί να έχει;



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

- 1 Να γράψετε τα πολυώνυμα κατά τις φθίνουσες δυνάμεις του x .
 α) $P(x) = 3x - 5x^2 + x^4 + 10 + 2x^3$ β) $Q(x) = -6x + 2x^3 + 1$
 γ) $A(x) = -3x^2 + 7 + 2x^3 + 7x$ δ) $B(x) = x - x^4 - 5$
- 2 Δίνεται το πολυώνυμο $A = -2xy^2 + y^3 + 2x^3 - xy^2$.
 α) Να βρείτε την αριθμητική του τιμή για $x = 2$ και $y = -1$.
 β) Να γράψετε το πολυώνυμο κατά τις φθίνουσες δυνάμεις του y . Ποιος είναι ο βαθμός του ως προς x και y ;
- 3 Αν $P(x) = 2x^2 + 2x - 9$, να αποδείξετε ότι:
 α) $P(-3) = P(2)$ β) $3P(1) + P(3) = 0$
- 4 Η επιφάνεια ενός σταδίου αποτελείται από δύο ημικυκλικούς δίσκους και ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, που έχει μήκος 100 μέτρα και πλάτος $2x$ μέτρα.
 α) Να βρείτε την περίμετρο και το εμβαδόν του.
 β) Να υπολογίσετε την περίμετρο και το εμβαδόν του, αν το πλάτος του είναι ίσο με 60 μέτρα.



5 Να κάνετε τις πράξεις:

α) $(2x^2 - x) - (x^3 - 5x^2 + x - 1)$

β) $-3x^2y - (2xy - yx^2) + (3xy - y^3)$

γ) $(2a^2 - 3aβ) - (β^2 + 4aβ) - (a^2 + β^2)$

δ) $2ω^2 - [4ω - 3 - (ω^2 + 5ω)]$

ε) $\left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{4}x + 1\right) - \left(\frac{1}{6}x + x^2 - \frac{1}{3}\right)$

στ) $(0,4x^3 + 2,3x^2) + (3,6x^3 - 0,3x^2 + 4)$

6 Αν $A(x) = 2x^3 - x^2 + x - 4$, $B(x) = -3x^3 + 5x - 2$ και $\Gamma(x) = 4x^2 - 3x + 8$, να βρείτε τα πολυώνυμα:

α) $A(x) - B(x)$

β) $A(x) + \Gamma(x)$

γ) $\Gamma(x) - [A(x) + B(x)]$

7 Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω ισότητες:

α) $(\dots - 4x \dots) + (x^2 \dots + 4) = -6x^2 - 8x + 7$


β) $(-x^3 \dots + 8) - (\dots + x^2 \dots) = x^3 - x^2 + 5x + 9$

8 Να συμπληρώσετε το παρακάτω τετράγωνο ώστε να είναι μαγικό. (Τα τρία πολυώνυμα οριζοντίως, καθέτως και διαγωνίως έχουν το ίδιο άθροισμα).

$2x^2+2x-3$	$7x^2+3x-4$	
$9x^2-3x+2$		
$4x^2+4x-5$		

9 Αν $P(x) = (-5x^2 + 4x - 3) - (x^2 - 2x + 1) + (3x^2 + x)$ και $Q(x) = ax^2 + bx + \gamma$, να βρείτε τις τιμές των a , β , γ , ώστε τα πολυώνυμα $P(x)$ και $Q(x)$ να είναι ίσα.

10 Ένας ποδηλάτης ξεκινάει από το σημείο A και σε χρόνο t sec κατεβαίνει το δρόμο AB με επιτάχυνση $a = 2 \text{ m/sec}^2$. Όταν φτάσει στο σημείο B, συνεχίζει να κινείται στο δρόμο BΓ για 10 sec με σταθερή ταχύτητα. Να βρείτε την παράσταση που εκφράζει την απόσταση που διήνυσε ο ποδηλάτης. Ποια απόσταση διήνυσε ο ποδηλάτης, αν $t = 5 \text{ sec}$;



1.4

Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων



Μαθαίνω να πολλαπλασιάζω:

✓ Μονώνυμο με πολυώνυμο

✓ Πολυώνυμο με πολυώνυμο



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1. Να γράψετε το γινόμενο $a(\beta + \gamma)$ σύμφωνα με την επιμεριστική ιδιότητα και με ανάλογο τρόπο να βρείτε την παράσταση $3x^2(2x^3 + 6x)$.
2. Να γράψετε το γινόμενο $(a + \beta)(\gamma + \delta)$ σύμφωνα με την επιμεριστική ιδιότητα και με ανάλογο τρόπο να βρείτε την παράσταση $(3x^2y + 2y)(2x^2 + 5)$.

Πολλαπλασιασμός μονωνύμου με πολυώνυμο

Την αλγεβρική παράσταση $3x^2(2x^3 + 6x)$ που είναι γινόμενο του μονωνύμου $3x^2$ με το πολυώνυμο $2x^3 + 6x$, σύμφωνα με την επιμεριστική ιδιότητα, μπορούμε να τη γράψουμε

$$3x^2(2x^3 + 6x) = 3x^2 \cdot 2x^3 + 3x^2 \cdot 6x = 6x^5 + 18x^3$$

Διαπιστώνουμε ότι:

Για να πολλαπλασιάσουμε μονώνυμο με πολυώνυμο, πολλαπλασιάζουμε το μονώνυμο με κάθε όρο του πολυωνύμου και προσθέτουμε τα γινόμενα που προκύπτουν.

Πολλαπλασιασμός πολυωνύμου με πολυώνυμο

Την αλγεβρική παράσταση $(3x^2y + 2y)(2x^2 + 5)$ που είναι γινόμενο του πολυωνύμου $3x^2y + 2y$ με το πολυώνυμο $2x^2 + 5$, σύμφωνα με την επιμεριστική ιδιότητα, μπορούμε να τη γράψουμε

$$\begin{aligned} (3x^2y + 2y)(2x^2 + 5) &= 3x^2y \cdot 2x^2 + 3x^2y \cdot 5 + 2y \cdot 2x^2 + 2y \cdot 5 = \\ &= 6x^4y + \underbrace{15x^2y + 4x^2y}_{19x^2y} + 10y = 6x^4y + 19x^2y + 10y \end{aligned}$$

Διαπιστώνουμε ότι:

Για να πολλαπλασιάσουμε πολυώνυμο με πολυώνυμο, πολλαπλασιάζουμε κάθε όρο του ενός πολυωνύμου με κάθε όρο του άλλου πολυωνύμου και προσθέτουμε τα γινόμενα που προκύπτουν.

Όταν κάνουμε πολλαπλασιασμό μονωνύμου με πολυώνυμο ή δύο πολυωνύμων, λέμε ότι αναπτύσσουμε τα γινόμενα αυτά και το αποτέλεσμα ονομάζεται **ανάπτυγμα του γινομένου**.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ



1 Να γίνουν οι πράξεις:

$$\alpha) -\frac{2}{3} x^2 y \left(x - \frac{1}{3} y - 3 \right)$$

$$\beta) (2x^2 - 5x + 6)(x - 2)$$

$$\gamma) 4x(-2x^2 + 3x - 1) - 3x^2(-2x + 5)$$

$$\delta) -2x^2(x + 4)(x - 1)$$

Λύση

$$\alpha) -\frac{2}{3} x^2 y \left(x - \frac{1}{3} y - 3 \right) = -\frac{2}{3} x^3 y + \frac{2}{9} x^2 y^2 + 2x^2 y$$

$$\beta) (2x^2 - 5x + 6)(x - 2) = 2x^3 - 4x^2 - 5x^2 + 10x + 6x - 12 = 2x^3 - 9x^2 + 16x - 12$$


$$\gamma) 4x(-2x^2 + 3x - 1) - 3x^2(-2x + 5) = -8x^3 + 12x^2 - 4x + 6x^3 - 15x^2 = -2x^3 - 3x^2 - 4x$$

$$\delta) -2x^2(x + 4)(x - 1) = -2x^2(x^2 - x + 4x - 4) = -2x^2(x^2 + 3x - 4) = -2x^4 - 6x^3 + 8x^2$$

► Ο πολλαπλασιασμός δύο πολυωνύμων μπορεί να γίνει όπως και ο πολλαπλασιασμός των αριθμών. Για παράδειγμα, ο πολλαπλασιασμός του (β) ερωτήματος $(2x^2 - 5x + 6)(x - 2)$ γίνεται και ως εξής:

$$\begin{array}{r} 2x^2 - 5x + 6 \\ \times \quad x - 2 \\ \hline -4x^2 + 10x - 12 \\ + 2x^3 - 5x^2 + 6x \\ \hline 2x^3 - 9x^2 + 16x - 12 \end{array}$$

2 Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η πρόσοψη μιας πόρτας, που είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Αν ένα μέρος της πόρτας είναι διακοσμητικό τζάμι, να προσδιοριστεί το πολυώνυμο που εκφράζει το εμβαδόν του αλουμινίου, το οποίο απαιτείται για την κατασκευή της πρόσοψης της πόρτας.



Λύση

Η πόρτα έχει σχήμα ορθογωνίου με διαστάσεις $2x + y$ και $4x + 10$, οπότε έχει εμβαδόν $(2x + y)(4x + 10)$.

Το διακοσμητικό τζάμι έχει σχήμα ορθογωνίου με διαστάσεις y και $x + 10$, οπότε έχει εμβαδόν $y(x + 10)$.

Επομένως, το εμβαδόν του αλουμινίου που απαιτείται για την κατασκευή της πρόσοψης της πόρτας είναι:

$$\begin{aligned} (2x + y)(4x + 10) - y(x + 10) &= 8x^2 + 20x + 4xy + 10y - xy - 10y = \\ &= 8x^2 + 20x + 3xy \end{aligned}$$



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

1. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα αντιστοιχίζοντας σε κάθε παράσταση της στήλης Α, το αποτέλεσμά της από τη στήλη Β.

Στήλη Α	Στήλη Β
α. $x(x + 1)$	1. $x^2 - x$
β. $(x + 1)(x - 1)$	2. $x^2 + 1$
γ. $x(x - 1)$	3. $x^2 + 2x + 1$
δ. $(x + 1)(1 + x)$	4. $x^2 + 2x + 3$
ε. $(x + 1)(x + 2)$	5. $x^2 + x$
	6. $x^2 + 3x + 2$
	7. $x^2 - 1$

α	β	γ	δ	ε

2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με (Σ), αν είναι σωστές ή με (Λ) αν είναι λανθασμένες.


- α) Αν το πολυώνυμο $P(x)$ έχει βαθμό 3 και το πολυώνυμο $Q(x)$ έχει βαθμό 2, τότε το πολυώνυμο $P(x) \cdot Q(x)$ έχει βαθμό 6.
- β) Αν το πολυώνυμο $P(x) \cdot Q(x)$ έχει βαθμό 7 και το πολυώνυμο $P(x)$ έχει βαθμό 3, τότε το πολυώνυμο $Q(x)$ έχει βαθμό 4.

3. Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά:

- α) $x(2x + \dots) = \dots + 4x$
- β) $3x^2(\dots - 2) = 3x^3y - \dots$
- γ) $(x + 5)(\dots + 3) = 2x^2 + \dots + 10x + \dots$
- δ) $(x^2 + y)(x - \dots) = \dots - x^2y^2 + \dots - y^3$

4. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.


- i) Ο όγκος του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου είναι:
 - α) $3x + 1$
 - β) $x^3 + 1$
 - γ) $x^3 + x^2$
 - δ) $x^3 + x$
- ii) Το εμβαδόν του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου είναι:
 - α) $6x^2 + 4x + 1$
 - β) $4x^2 + 6x$
 - γ) $6x^2 + 4x + 2$
 - δ) $6x^2 + 4x$



5. Ο καθηγητής των Μαθηματικών ζήτησε από τους μαθητές του να γράψουν την αλγεβρική παράσταση που εκφράζει το εμβαδόν του ορθογωνίου ΑΒΓΔ και οι μαθητές του έδωσαν τις εξής απαντήσεις:

- α) $(x + 2)(x + 3)$
- β) $2x \cdot 3x$
- γ) $x^2 + 6$
- δ) $x^2 + 5x + 6$

Ποιές απ' αυτές είναι σωστές;





ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

1 Να κάνετε τις πράξεις:

α) $-3x^2y(-5x + 2y)$

β) $4x(2x^2 - x + 2) - 8x$

γ) $-5x(2x - 3) - 3x(2 - 3x)$

δ) $2xy(x^2 - 3y^2) - 4x(x^2y - 2y^3)$

2 Να κάνετε τις πράξεις:

α) $(2a - 3b)(-4a + 2b)$

β) $(x^2 - 2x + 4)(x + 2) - 8$

γ) $3x^2(-2x + 3)(5 - x)$

δ) $(4 - 3x)(5 - 2x) - 6x(x - 4)$

ε) $(2x^2 - 3x - 4)(-3x^2 + x)$

στ) $(3x^2 - 2xy - 5y^2)(4y - x)$

3 Να κάνετε τις πράξεις:

α) $(3x - 2)(x^2 - x)(4x - 3)$

β) $-2x(x^2 - x + 1)(x - 2) - (x - 1)(2x - 3)(x + 2)$

γ) $(-2x + y)(x^2 - 3xy) - (3x - y)(4x + y)(-2x - 3y)$

4 Να αποδείξετε τις ισότητες:

α) $(x^2 - 4x + 4)(x^2 + 4x + 4) - x^2(x^2 - 8) - 16 = 0$

β) $(3a + 8b)(b - a) - (a + 2b)(b - 3a) = 6b^2$

5 Αν $P(x) = -2x^2 + 5x - 3$ και $Q(x) = 4x - 5$, να βρείτε τα πολυώνυμα:


α) $P(x) \cdot Q(x)$

β) $P(x) \cdot [-3Q(x) + 11x - 12]$

γ) $[P(x) - 2] \cdot [Q(x) + 3]$

6 Αν $P(x) = 3x(-2x + 4)(x - 1)$ και $Q(x) = ax^3 + bx^2 + \gamma x + \delta$, να βρείτε τις τιμές των a, β, γ, δ , ώστε τα πολυώνυμα $P(x)$ και $Q(x)$ να είναι ίσα.

7 Να βρείτε την πλευρά τετραγώνου που έχει εμβαδόν ίσο με το εμβαδόν του διπλανού σχήματος.



8 Ένα οικόπεδο έχει σχήμα ορθογωνίου με πλάτος x μέτρα και με μήκος μεγαλύτερο από το πλάτος του κατά 5 μέτρα. Αν το μήκος ελαττωθεί κατά 3 μέτρα και το πλάτος ελαττωθεί κατά 1 μέτρο, να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του οικοπέδου θα μειωθεί κατά $4x + 2$ τετραγωνικά μέτρα.

1.5 Αξιοσημείωτες ταυτότητες



- ✓ *Θυμάμαι ποια ισότητα λέγεται ταυτότητα.*
- ✓ *Γνωρίζω ποιες είναι οι βασικές ταυτότητες.*
- ✓ *Μαθαίνω να αποδεικνύω μια απλή ταυτότητα.*



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ


1. Ποιες από τις ισότητες $3x = 12$, $x + y = 7$, $4a = 3a + a$, $x(x + 2) = x^2 + 2x$, αληθεύουν για όλες τις τιμές των μεταβλητών τους;

2. α) Να βρείτε το συνολικό εμβαδόν των πράσινων σχημάτων.

β) Ποια από τις παρακάτω παραστάσεις εκφράζει το εμβαδόν του κίτρινου τετραγώνου;

- i) $x^2 + 9$ ii) $(x + 3)^2$
iii) $x^2 + 6x$ iv) $6x + 9$

γ) Να συγκρίνετε το συνολικό εμβαδόν των πράσινων σχημάτων με το εμβαδόν του κίτρινου τετραγώνου.



Υπάρχουν ισότητες που περιέχουν μεταβλητές και αληθεύουν για ορισμένες τιμές των μεταβλητών τους. Για παράδειγμα, η ισότητα $3x = 12$, αληθεύει για $x = 4$ και δεν αληθεύει για καμιά άλλη τιμή του x . Ομοίως, η ισότητα $x + y = 7$, αληθεύει για $x = 1$ και $y = 6$, ή για $x = 3$ και $y = 4$, ενώ δεν αληθεύει για $x = 4$ και $y = 5$.

Υπάρχουν όμως και ισότητες, που αληθεύουν για όλες τις τιμές των μεταβλητών τους όπως για παράδειγμα οι ισότητες: $a + \beta = \beta + a$, $4a = 3a + a$, $x(x + 2) = x^2 + 2x$. Οι ισότητες αυτές λέγονται **ταυτότητες**.

Γενικά

Ταυτότητα λέγεται κάθε ισότητα που περιέχει μεταβλητές και αληθεύει για όλες τις τιμές των μεταβλητών της.

Ταυτότητες υπάρχουν πολλές, ορισμένες από αυτές τις συναντάμε πολύ συχνά και γι' αυτό αξίζει να τις θυμόμαστε. **Αξιοσημείωτες ταυτότητες** είναι:

α) Τετράγωνο αθροίσματος

Αν την παράσταση $(a + b)^2$ τη γράψουμε $(a + b)(a + b)$ και βρούμε το ανάπτυγμα του γινομένου, έχουμε:

$$\begin{aligned}(a + b)^2 &= (a + b)(a + b) = \\ &= a^2 + ab + ba + b^2 = \\ &= a^2 + 2ab + b^2\end{aligned}$$

Αποδείξαμε λοιπόν την ταυτότητα $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

Το δεύτερο μέρος της προηγούμενης ισότητας λέγεται **ανάπτυγμα** του $(a + b)^2$.

Για παράδειγμα, το ανάπτυγμα του $(y + 4)^2$ προκύπτει, αν στην προηγούμενη ταυτότητα αντικαταστήσουμε το a με το y και το b με το 4 , οπότε έχουμε:

$$(y + 4)^2 = y^2 + 2 \cdot y \cdot 4 + 4^2 = y^2 + 8y + 16.$$

Η προηγούμενη ταυτότητα, όπως και όλες οι επόμενες, χρησιμοποιούνται και όταν τα a , b είναι οποιεσδήποτε αλγεβρικές παραστάσεις, π.χ.

$$\begin{aligned}(2x + 3y)^2 &= (2x)^2 + 2 \cdot 2x \cdot 3y + (3y)^2 = 4x^2 + 12xy + 9y^2 \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow & \\ (a + b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2\end{aligned}$$

β) Τετράγωνο διαφοράς

Αν την παράσταση $(a - b)^2$ τη γράψουμε $(a - b)(a - b)$ και βρούμε το ανάπτυγμα του γινομένου, τότε μπορούμε να αποδείξουμε και την ταυτότητα

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Πράγματι έχουμε:

$$(a - b)^2 = (a - b)(a - b) = a^2 - ab - ba + b^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Για παράδειγμα, το ανάπτυγμα του $(y - 4)^2$ προκύπτει, αν αντικαταστήσουμε το a με το y και το b με το 4 , οπότε έχουμε:

$$(y - 4)^2 = y^2 - 2 \cdot y \cdot 4 + 4^2 = y^2 - 8y + 16$$

Ομοίως, για να υπολογίσουμε το ανάπτυγμα του $(3x - 4y)^2$ έχουμε:

$$\begin{aligned}(3x - 4y)^2 &= (3x)^2 - 2 \cdot (3x) \cdot (4y) + (4y)^2 = 9x^2 - 24xy + 16y^2 \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow & \\ (a - b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2\end{aligned}$$

Γεωμετρική ερμηνεία

Η ταυτότητα

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
για θετικούς αριθμούς a και b μπορεί να ερμηνευθεί και γεωμετρικά. Το τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ έχει πλευρά $a + b$, οπότε το εμβαδόν του είναι:


$$E = (a + b)^2 \quad (1)$$

Το εμβαδόν όμως του τετραγώνου $AB\Gamma\Delta$ προκύπτει ακόμη κι αν προσθέσουμε

τα εμβαδά των σχημάτων που το αποτελούν. Δηλαδή $E = a^2 + ab + ab + b^2$ ή $E = a^2 + 2ab + b^2$ (2)

Από τις ισότητες (1) και (2) διαπιστώνουμε ότι

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$



γ) Κύβος αθροίσματος – διαφοράς

Αν την παράσταση $(a + \beta)^3$ τη γράψουμε $(a + \beta)(a + \beta)^2$ και κάνουμε τον πολλαπλασιασμό του $a + \beta$ με το ανάπτυγμα του $(a + \beta)^2$, έχουμε:

$$\begin{aligned}(a + \beta)^3 &= (a + \beta)(a + \beta)^2 = \\ &= (a + \beta)(a^2 + 2a\beta + \beta^2) = \\ &= a^3 + 2a^2\beta + a\beta^2 + a^2\beta + 2a\beta^2 + \beta^3 = \\ &= a^3 + 3a^2\beta + 3a\beta^2 + \beta^3\end{aligned}$$

Αποδείξαμε λοιπόν την ταυτότητα

$$(a + \beta)^3 = a^3 + 3a^2\beta + 3a\beta^2 + \beta^3$$

Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να αποδείξουμε και την ταυτότητα

$$(a - \beta)^3 = a^3 - 3a^2\beta + 3a\beta^2 - \beta^3$$

Σύμφωνα με τις προηγούμενες ταυτότητες έχουμε:

- $(x + 2)^3 = x^3 + 3 \cdot x^2 \cdot 2 + 3 \cdot x \cdot 2^2 + 2^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$
- $(2x - 5)^3 = (2x)^3 - 3 \cdot (2x)^2 \cdot 5 + 3 \cdot (2x) \cdot 5^2 - 5^3 = 8x^3 - 60x^2 + 150x - 125.$

δ) Γινόμενο αθροίσματος επί διαφορά

Αν βρούμε το ανάπτυγμα του γινομένου $(a + \beta)(a - \beta)$ έχουμε:

$$(a + \beta)(a - \beta) = a^2 - \cancel{a\beta} + \cancel{\beta a} - \beta^2 = a^2 - \beta^2$$

Αποδείξαμε λοιπόν την ταυτότητα

$$(a + \beta)(a - \beta) = a^2 - \beta^2$$

Η προηγούμενη ταυτότητα χρησιμοποιείται για να βρίσκουμε γρήγορα το γινόμενο αθροίσματος δύο παραστάσεων επί τη διαφορά τους. Για παράδειγμα, έχουμε:

- $(x + 2)(x - 2) = x^2 - 2^2 = x^2 - 4$
- $(3a + 2\beta)(3a - 2\beta) = (3a)^2 - (2\beta)^2 = 9a^2 - 4\beta^2$

ε) Διαφορά κύβων – Άθροισμα κύβων

Η παράσταση $(a - \beta)(a^2 + a\beta + \beta^2)$ γράφεται:

$$(a - \beta)(a^2 + a\beta + \beta^2) = a^3 + \cancel{a^2\beta} + \cancel{a\beta^2} - \beta a^2 - \cancel{a\beta^2} - \beta^3 = a^3 - \beta^3$$

Αποδείξαμε λοιπόν την ταυτότητα

$$(a - \beta)(a^2 + a\beta + \beta^2) = a^3 - \beta^3$$

Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να αποδείξουμε και την ταυτότητα

$$(a + \beta)(a^2 - a\beta + \beta^2) = a^3 + \beta^3$$

Οι προηγούμενες ταυτότητες χρησιμοποιούνται για να βρίσκουμε γρήγορα γινόμενα παραστάσεων που έχουν τις αντίστοιχες μορφές. Για παράδειγμα έχουμε:

- $(x - 2)(x^2 + 2x + 4) = (x - 2)(x^2 + 2x + 2^2) = x^3 - 2^3 = x^3 - 8$
- $(x + 3)(x^2 - 3x + 9) = (x + 3)(x^2 - 3x + 3^2) = x^3 + 3^3 = x^3 + 27$



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- 1 α) Να αποδειχθεί η ταυτότητα $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$.
 β) Να βρεθεί το ανάπτυγμα του $(3x + 2y + 4)^2$.

Λύση

$$\begin{aligned} \alpha) (a + b + c)^2 &= (a + b + c)(a + b + c) = \\ &= a^2 + ab + ac + ba + b^2 + bc + ca + cb + c^2 = \\ &= a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \beta) \text{ Σύμφωνα με την προηγούμενη ταυτότητα,} \\ \text{το ανάπτυγμα του } (3x + 2y + 4)^2 \text{ είναι:} \\ (3x + 2y + 4)^2 &= \\ &= (3x)^2 + (2y)^2 + 4^2 + 2 \cdot 3x \cdot 2y + 2 \cdot 2y \cdot 4 + 2 \cdot 3x \cdot 4 = \\ &= 9x^2 + 4y^2 + 16 + 12xy + 16y + 24x. \end{aligned}$$

	α	β	γ	
α	α ²	αβ	αγ	α
β	αβ	β ²	βγ	β
γ	αγ	βγ	γ ²	γ

$$(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$$

- 2 α) Να αποδειχθούν οι ταυτότητες
 $a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$ και $a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b)$.
 β) Αν $x + \frac{2}{x} = 3$, να υπολογιστούν οι τιμές των παραστάσεων $x^2 + \frac{4}{x^2}$ και $x^3 + \frac{8}{x^3}$.

Λύση

$$\begin{aligned} \alpha) \text{ Κάνουμε τις πράξεις στο δεύτερο μέλος κάθε ταυτότητας και έχουμε:} \\ (a + b)^2 - 2ab &= a^2 + 2ab + b^2 - 2ab = a^2 + b^2 \\ (a + b)^3 - 3ab(a + b) &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 - 3a^2b - 3ab^2 = a^3 + b^3. \end{aligned}$$

$$\beta) \text{ Η παράσταση } x^2 + \frac{4}{x^2} \text{ γράφεται } x^2 + \left(\frac{2}{x}\right)^2 \text{ και σύμφωνα με την ταυτότητα}$$

$$a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab \text{ έχουμε:}$$

$$x^2 + \frac{4}{x^2} = x^2 + \left(\frac{2}{x}\right)^2 = \left(x + \frac{2}{x}\right)^2 - 2x \cdot \frac{2}{x} = 3^2 - 2 \cdot 2 = 9 - 4 = 5.$$

$$\text{Η παράσταση } x^3 + \frac{8}{x^3} \text{ γράφεται } x^3 + \left(\frac{2}{x}\right)^3 \text{ και σύμφωνα με την ταυτότητα}$$

$$a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b) \text{ έχουμε:}$$


$$x^3 + \frac{8}{x^3} = x^3 + \left(\frac{2}{x}\right)^3 = \left(x + \frac{2}{x}\right)^3 - 3x \cdot \frac{2}{x} \cdot \left(x + \frac{2}{x}\right) = 3^3 - 3 \cdot 2 \cdot 3 = 27 - 18 = 9$$

- 3 Σε ένα οικόπεδο που έχει σχήμα τετραγώνου πλευράς a , αν μειωθεί η μία διάστασή του κατά β και ταυτόχρονα η άλλη διάστασή του αυξηθεί κατά β , πόσο θα μεταβληθεί το εμβαδόν του;

Λύση

Το εμβαδόν του τετραγώνου είναι a^2 . Αν αλλάξουν οι πλευρές του, τότε το

οικόπεδο θα γίνει ορθογώνιο με διαστάσεις $a - \beta$ και $a + \beta$, οπότε θα έχει εμβαδόν $(a - \beta)(a + \beta) = a^2 - \beta^2$. Δηλαδή, το εμβαδόν από το a^2 θα γίνει $a^2 - \beta^2$, που σημαίνει ότι θα μειωθεί κατά β^2 .



- 4** Να μετατραπεί το κλάσμα $\frac{2}{3 - \sqrt{5}}$ που έχει άρρητο παρονομαστή σε ισοδύναμο κλάσμα με ρητό παρονομαστή.

Λύση

Για να μετατραπεί ο παρονομαστής σε ρητό αριθμό πολλαπλασιάζουμε και τους δύο όρους του κλάσματος με $3 + \sqrt{5}$, γιατί $(3 - \sqrt{5})(3 + \sqrt{5}) = 3^2 - (\sqrt{5})^2 = 9 - 5 = 4$. Επομένως

$$\frac{2}{3 - \sqrt{5}} = \frac{2(3 + \sqrt{5})}{(3 - \sqrt{5})(3 + \sqrt{5})} = \frac{2(3 + \sqrt{5})}{4} = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}.$$

- 5** α) Να αποδειχθεί η ταυτότητα $(v - 1)(v + 1) + 1 = v^2$.
β) Να αποδειχθεί ότι ο αριθμός $2007 \cdot 2009 + 1$ είναι τετράγωνο ενός ακεραίου αριθμού, τον οποίο και να προσδιορίσετε.

Λύση

α) $(v - 1)(v + 1) + 1 = (v^2 - 1^2) + 1 = v^2 - 1 + 1 = v^2$.

β) Αν $v = 2008$, τότε $v - 1 = 2007$ και $v + 1 = 2009$.

Σύμφωνα με την προηγούμενη ταυτότητα έχουμε:

$$2007 \cdot 2009 + 1 = (v - 1)(v + 1) + 1 = v^2 = 2008^2.$$

Άρα, ο αριθμός $2007 \cdot 2009 + 1$ είναι το τετράγωνο του ακεραίου 2008.

- Ορισμένοι αριθμητικοί υπολογισμοί γίνονται πιο σύντομα με τη βοήθεια των ταυτοτήτων π.χ.

$$99 \cdot 101 = (100 - 1)(100 + 1) = 100^2 - 1^2 = 10000 - 1 = 9999$$

$$103^2 = (100 + 3)^2 = 100^2 + 2 \cdot 100 \cdot 3 + 3^2 = 10609$$

- 6** Να γίνουν οι πράξεις:
α) $(2x - 3)^2 - 2(3x - 1)(3x + 1)$ β) $(x - 2y)^3 - (x - y)(x^2 + xy + y^2)$.

Λύση

α) $(2x - 3)^2 - 2(3x - 1)(3x + 1) = [(2x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot 3 + 3^2] - 2[(3x)^2 - 1^2] =$
 $= (4x^2 - 12x + 9) - 2(9x^2 - 1) =$
 $= 4x^2 - 12x + 9 - 18x^2 + 2 = -14x^2 - 12x + 11$

β) $(x - 2y)^3 - (x - y)(x^2 + xy + y^2) = [x^3 - 3 \cdot x^2 \cdot 2y + 3 \cdot x \cdot (2y)^2 - (2y)^3] - (x^3 - y^3) =$
 $= x^3 - 6x^2y + 12xy^2 - 8y^3 - x^3 + y^3 =$
 $= -6x^2y + 12xy^2 - 7y^3$

- 7** Να αποδειχθεί ότι $(a^2 + b^2)(x^2 + y^2) = (ax + by)^2 + (ay - bx)^2$
(Ταυτότητα Lagrange).

Λύση

Το 1ο μέλος της ταυτότητας γράφεται:

$$(a^2 + b^2)(x^2 + y^2) = a^2x^2 + a^2y^2 + b^2x^2 + b^2y^2$$

Το 2ο μέλος της ταυτότητας γράφεται:

$$\begin{aligned} (ax + by)^2 + (ay - bx)^2 &= (ax)^2 + 2(ax)(by) + (by)^2 + (ay)^2 - 2(ay)(bx) + (bx)^2 = \\ &= a^2x^2 + 2abxy + b^2y^2 + a^2y^2 - 2abxy + b^2x^2 = \\ &= a^2x^2 + a^2y^2 + b^2x^2 + b^2y^2 \end{aligned}$$

Άρα $(a^2 + b^2)(x^2 + y^2) = (ax + by)^2 + (ay - bx)^2$.

Όπως είδαμε στα προηγούμενα παραδείγματα για να αποδείξουμε μία ταυτότητα $A = B$, μπορούμε να εργαστούμε ως εξής:

- Ξεκινάμε από το ένα μέλος της ταυτότητας και καταλήγουμε στο άλλο (παραδείγματα 1, 2, 5) ή
- – Κάνουμε τις πράξεις στο 1ο μέλος της ταυτότητας και καταλήγουμε σε μία ισότητα $A = \Gamma$.
- – Κάνουμε τις πράξεις στο 2ο μέλος της ταυτότητας και καταλήγουμε σε μια ισότητα $B = \Gamma$.

Αφού $A = \Gamma$ και $B = \Gamma$ συμπεραίνουμε ότι $A = B$ (παράδειγμα 7).

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ



- 1** Ποιες από τις παρακάτω ισότητες είναι ταυτότητες;
 α) $0x = 0$ β) $x + y = 0$ γ) $a^2a = a^3$ δ) $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$ ε) $ab = 0$
- 2** Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
- i) Το ανάπτυγμα του $(x + a)^2$ είναι:
 α) $x^2 + a^2$ β) $x^2 - 2xa + a^2$ γ) $x^2 + xa + a^2$ δ) $x^2 + 2xa + a^2$
- ii) Το ανάπτυγμα του $(2a + 1)^2$ είναι:
 α) $2a^2 + 4a + 1$ β) $4a^2 + 1$ γ) $4a^2 + 4a + 1$ δ) $4a^2 + 2a + 1$
- iii) Το ανάπτυγμα του $(y - 2)^2$ είναι:
 α) $y^2 - 2y + 4$ β) $y^2 - 4$ γ) $y^2 - 4y + 4$ δ) $y^2 + 4y + 4$
- 3** Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω ισότητες με (Σ), αν είναι σωστές ή με (Λ), αν είναι λανθασμένες.
- α) $(x - y)^2 = x^2 - 2x(-y) + (-y)^2$
- β) $(-a + b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- γ) $(5\omega + 4)^2 = 25\omega^2 + 16$
- δ) $(3x - y)^2 = 3x^2 - 2 \cdot 3x \cdot y + y^2$

4 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

i) Το ανάπτυγμα του $(x + 1)^3$ είναι:

α) $x^3 + 3 \cdot x \cdot 1 + 1^3$

β) $x^3 + 1^3$

γ) $x^3 + 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 3 \cdot x \cdot 1^2 + 1^3$

δ) $x^3 + x^2 \cdot 1 + x \cdot 1^2 + 1^3$

ii) Το ανάπτυγμα του $(\beta - 2)^3$ είναι:

α) $\beta^3 - 3 \cdot \beta \cdot 2 + 2^3$

β) $\beta^3 - 2^3$

γ) $\beta^3 - \beta^2 \cdot 2 + \beta \cdot 2^2 - 2^3$

δ) $\beta^3 - 3 \cdot \beta^2 \cdot 2 + 3 \cdot \beta \cdot 2^2 - 2^3$

5 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω ισότητες με (Σ) αν είναι σωστές ή με (Λ), αν είναι λανθασμένες.

α) $(x - y)^3 = x^3 - 3x^2y - 3xy^2 - y^3$

β) $(2x + 3)^3 = 2x^3 + 3 \cdot 2x^2 \cdot 3 + 3 \cdot 2x \cdot 3^2 + 3^3$

γ) $(3x - 1)^3 = (3x)^3 - 3(3x)^2 \cdot 1 + 3(3x) \cdot 1^2 + 1^3$

δ) $(x + 2)^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$

6 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

i) Το ανάπτυγμα του $(y - 3)(y + 3)$ είναι:

α) $y^2 - 3$

β) $9 - y^2$

γ) $y^2 - 9$

δ) $3 - y^2$

ii) Το ανάπτυγμα του $(y + x)(x - y)$ είναι:

α) $y^2 - x^2$

β) $x^2 - y^2$

γ) $(x - y)^2$

δ) $x^2 + y^2$

iii) Το ανάπτυγμα του $(\omega - 2\alpha)(\omega + 2\alpha)$ είναι:

α) $\omega^2 - 2\alpha^2$

β) $\omega^2 + 4\alpha^2$

γ) $4\alpha^2 - \omega^2$

δ) $\omega^2 - 4\alpha^2$

iv) Το ανάπτυγμα του $(5 - x)(5^2 + 5x + x^2)$ είναι:

α) $5^3 + x^3$

β) $x^3 - 5^3$

γ) $5^3 - x^3$

δ) $25 - x^3$

v) Το ανάπτυγμα του $(x + 2\alpha)(x^2 - 2\alpha x + 4\alpha^2)$ είναι:

α) $x^3 + 2\alpha^3$

β) $x^3 - (2\alpha)^3$

γ) $x^3 - 2\alpha^3$

δ) $x^3 + 8\alpha^3$

7 Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα αντιστοιχίζοντας σε κάθε παράσταση της στήλης Α, το ανάπτυγμά της από τη στήλη Β.

Στήλη Α	Στήλη Β
α. $(x + y)(y - x)$	1. $x^2 - 2xy + y^2$
β. $(x + y)^2$	2. $x^3 - y^3$
γ. $(y - x)^2$	3. $x^3 - 3x^2y + 3xy^2 + y^3$
δ. $(x - y)(x^2 + xy + y^2)$	4. $y^2 - x^2$
ε. $(x + y)(x^2 - xy + y^2)$	5. $x^2 + 2xy + y^2$
στ. $(x - y)^3$	6. $x^2 - y^2$
	7. $x^3 + y^3$
	8. $x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$

α	β	γ	δ	ε	στ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ



1 Να βρείτε τα αναπτύγματα:

α) $(x + 2)^2$	β) $(y + 5)^2$	γ) $(2\omega + 1)^2$	δ) $(\kappa + 2\lambda)^2$
ε) $(3y + 2\beta)^2$	στ) $(x^2 + 1)^2$	ζ) $(y^2 + y)^2$	η) $(2x^2 + 3x)^2$
θ) $(x + \sqrt{2})^2$	ι) $(\sqrt{x} + \sqrt{y})^2$	ια) $(a + \frac{1}{2})^2$	ιβ) $(\omega + \frac{4}{\omega})^2$

2 Να βρείτε τα αναπτύγματα:

α) $(x - 3)^2$	β) $(y - 5)^2$	γ) $(3\omega - 1)^2$	δ) $(2\kappa - \lambda)^2$
ε) $(3y - 2\beta)^2$	στ) $(x^2 - 2)^2$	ζ) $(y^2 - y)^2$	η) $(2x^2 - 5x)^2$
θ) $(x - \sqrt{3})^2$	ι) $(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2$	ια) $(a - \frac{3}{2})^2$	ιβ) $(\omega - \frac{2}{\omega})^2$

3 Χρησιμοποιώντας την κατάλληλη ταυτότητα να υπολογίσετε τις παραστάσεις:

α) $(\sqrt{3} + 1)^2$	β) $(\sqrt{6} + \sqrt{5})^2$	γ) $(\sqrt{2} - 3)^2$	δ) $(1 - \sqrt{7})^2$
-----------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------

4 Να συμπληρώσετε τις ισότητες:

α) $(x \cdots \dots)^2 = \dots + \dots + 9$	β) $(\dots \cdots 4)^2 = y^2 - \dots \cdots \dots$
γ) $(\dots - \dots)^2 = 16x^2 \cdots 8x\alpha \cdots \dots$	δ) $(\dots \cdots 2\omega)^2 = \dots - 4x^2\omega \cdots \dots$

5 Να βρείτε τα αναπτύγματα:

α) $(x + 1)^3$	β) $(y + 4)^3$	γ) $(2a + 1)^3$	δ) $(3a + 2\beta)^3$
ε) $(x^2 + 3)^3$	στ) $(y^2 + y)^3$	ζ) $(x - 2)^3$	η) $(y - 5)^3$
θ) $(3a - 1)^3$	ι) $(2x - 3y)^3$	ια) $(y^2 - 2)^3$	ιβ) $(\omega^2 - 2\omega)^3$

6 Να βρείτε τα αναπτύγματα:

α) $(x - 1)(x + 1)$	β) $(y - 2)(y + 2)$	γ) $(3 - \omega)(3 + \omega)$
δ) $(x + 4)(4 - x)$	ε) $(x - y)(-x - y)$	στ) $(-x + y)(-x - y)$
ζ) $(2x + 7y)(2x - 7y)$	η) $(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})$	θ) $(\sqrt{x} + \sqrt{y})(\sqrt{x} - \sqrt{y})$

7 Να αποδείξετε ότι το πολυώνυμο $P(x) = (x - 3)^2 + (3x + 1)^2 - 10(x - 1)(x + 1)$ είναι σταθερό.

8 α) Να αποδείξετε ότι $(a - \beta)(a + \beta)(a^2 + \beta^2)(a^4 + \beta^4) = a^8 - \beta^8$.

β) Να υπολογίσετε το γινόμενο: $9 \cdot 11 \cdot 101 \cdot 10001$.

9 Να μετατρέψετε τα παρακάτω κλάσματα, που έχουν άρρητους παρονομαστές, σε ισοδύναμα κλάσματα με ρητούς παρονομαστές.

α) $\frac{1}{\sqrt{5} - 1}$	β) $\frac{6}{\sqrt{7} - \sqrt{3}}$	γ) $\frac{5}{3 + \sqrt{2}}$	δ) $\frac{12}{2\sqrt{3} + \sqrt{6}}$
-----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

10 Να βρείτε τα αναπτύγματα:

α) $(x - 3)(x^2 + 3x + 9)$

β) $(y + 2)(y^2 - 2y + 4)$

γ) $(2\omega + 1)(4\omega^2 - 2\omega + 1)$

δ) $(1 - a)(1 + a + a^2)$

11 Να κάνετε τις πράξεις:

α) $(x - 4)^2 + (2x + 5)^2$

β) $(x^2 - 1)^2 - (x^2 - 3)(x^2 + 3)$

γ) $(x + y)^2 - (x - 2y)(x + 2y) + (2x - y)^2$

δ) $(3x - 4)^2 + (3x + 4)^2 - 2(3x - 4)(3x + 4)$

ε) $(2\alpha + 1)^3 + (2\alpha - 1)^3$

στ) $(\alpha + 2)^3 - (\alpha + 2)(\alpha^2 - 2\alpha + 4)$

ζ) $(\alpha^2 + \alpha)^3 - (\alpha^2 - \alpha)^3$

η) $(4\alpha - 1)^3 - \alpha(8\alpha + 1)(8\alpha - 1)$

12 Να αποδείξετε ότι:

α) $(x - 2y)^2 - (2x - y)^2 + 3x^2 = 3y^2$

β) $(\alpha - 3\beta)^2 + (3\alpha + 2\beta)(3\alpha - 2\beta) - (3\alpha - \beta)^2 = \alpha^2 + 4\beta^2$

γ) $(x - 1)(x + 1)^3 - 2x(x - 1)(x + 1) = x^4 - 1$

δ) $(\alpha^2 + \beta^2)^2 - (2\alpha\beta)^2 = (\alpha^2 - \beta^2)^2$

ε) $(\alpha - 4)^2 + (2\alpha - 3)^2 = \alpha^2 + (2\alpha - 5)^2$

στ) $(2x^2 + 2x)^2 + (2x + 1)^2 = (2x^2 + 2x + 1)^2$

13 Αν $x = 3 + \sqrt{5}$ και $y = 3 - \sqrt{5}$, να υπολογίσετε τις παραστάσεις:

α) xy

β) $x^2 - y^2$

γ) $x^2 + y^2$


δ) $x^3 + y^3$

14 α) Να αποδείξετε ότι $\left(\alpha + \frac{5}{\alpha}\right)^2 - \left(\alpha - \frac{5}{\alpha}\right)^2 = 20$

β) Να υπολογίσετε τον αριθμό $x = \left(2005 + \frac{1}{401}\right)^2 - \left(2005 - \frac{1}{401}\right)^2$

15 Αν το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο, να αποδείξετε ότι και το τρίγωνο ΒΓΔ είναι ορθογώνιο.


- 16
- Σκεφτείτε δύο αριθμούς διαφορετικούς από το μηδέν.
 - Βρείτε το τετράγωνο του αθροίσματός τους.
 - Βρείτε το τετράγωνο της διαφοράς τους.
 - Αφαιρέστε από το τετράγωνο του αθροίσματος το τετράγωνο της διαφοράς.
 - Διαιρέστε το τελικό αποτέλεσμα με το γινόμενο των δύο αριθμών που αρχικά σκεφτήκατε.
 - Το αποτέλεσμα που βρήκατε είναι ο αριθμός 4 ανεξάρτητα από τους αριθμούς που επιλέξατε. Μπορείτε να το εξηγήσετε;



17 α) Να αποδείξετε ότι $\beta\gamma = \frac{\beta^2 + \gamma^2 - (\beta - \gamma)^2}{2}$.

β) Να υπολογίσετε το εμβαδόν ορθογωνίου τριγώνου, που έχει υποτείνουσα 10 cm, και οι κάθετες πλευρές του διαφέρουν κατά 2 cm.

18 Ένας πατέρας μοίρασε ένα οικόπεδο στα δύο παιδιά του, όπως φαίνεται στο σχήμα. Τα δύο οικόπεδα είχαν το ίδιο εμβαδόν ή κάποιο από τα παιδιά αδικήθηκε;
 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.



*Το τρίγωνο του Πασκάλ
 και το ανάπτυγμα των δυνάμεων του $a + β$*

1		$(a + β)^0 =$	1
1	1	$(a + β)^1 =$	$1a + 1β$
1	2	$(a + β)^2 =$	$1a^2 + 2aβ + 1β^2$
1	3	$(a + β)^3 =$	$1a^3 + 3a^2β + 3aβ^2 + 1β^3$
1	4	$(a + β)^4 =$	$1a^4 + 4a^3β + 6a^2β^2 + 4aβ^3 + 1β^4$
1	□	$(a + β)^5 =$ + + + + +
1	□	$(a + β)^6 =$

Παρατηρήστε τα αναπτύγματα των δυνάμεων του αθροίσματος $a + β$.

1. Οι αντίστοιχοι συντελεστές σε κάθε ανάπτυγμα σχηματίζουν μια γραμμή σ' ένα αριθμητικό τρίγωνο, που είναι γνωστό ως **τρίγωνο του Πασκάλ**. Το τρίγωνο αυτό πήρε το όνομά του από τον Γάλλο μαθηματικό Blaise Pascal (1623 - 1662) και οι αριθμοί του κρύβουν πολλές ιδιότητες. Ο πρώτος και ο τελευταίος αριθμός κάθε σειράς είναι 1.
 Μπορείτε να ανακαλύψετε με ποιον τρόπο προκύπτουν οι υπόλοιποι αριθμοί κάθε σειράς;




2. Συνεχίστε την κατασκευή του τριγώνου και βρείτε τα αναπτύγματα $(a + β)^5$ και $(a + β)^6$, αφού πρώτα ανακαλύψετε με ποιον τρόπο γράφονται οι δυνάμεις του a και του $β$ σε κάθε ανάπτυγμα.
3. Να βρείτε και το ανάπτυγμα του $(a - β)^6$, αν γνωρίζετε ότι και τα αναπτύγματα των δυνάμεων της διαφοράς $a - β$ προκύπτουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, μόνο που θέτουμε τα πρόσημα εναλλάξ, αρχίζοντας από +.
 π.χ. $(a - β)^2 = a^2 - 2aβ + β^2$, $(a - β)^3 = a^3 - 3a^2β + 3aβ^2 - β^3$
4. Μπορείτε να βρείτε ποιες άλλες ιδιότητες κρύβουν οι αριθμοί του τριγώνου Πασκάλ;



ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Πυθαγόρειες τριάδες



Πυθαγόρας

Αν οι αριθμοί α , β , γ εκφράζουν τα μήκη των πλευρών ενός ορθογωνίου τριγώνου, τότε όπως γνωρίζουμε, ισχύει το Πυθαγόρειο θεώρημα

$$\alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2 \quad (1)$$

Πόσα όμως ορθογώνια τρίγωνα μπορούμε να βρούμε που τα μήκη των πλευρών τους εκφράζονται με ακέραιους αριθμούς;

Μια τριάδα **θετικών ακεραίων** αριθμών α , β , γ , για την οποία ισχύει η σχέση (1), λέμε ότι αποτελεί **Πυθαγόρεια τριάδα**. Την απλούστερη Πυθαγόρεια τριάδα σχηματίζουν οι αριθμοί 5, 4, 3 αφού $5^2 = 4^2 + 3^2$.

Υπάρχουν, άραγε, τρόποι να σχηματίζουμε Πυθαγόρειες τριάδες;


Ο Πυθαγόρας (6ος αιώνας π.Χ.) γνώριζε ότι οι αριθμοί της μορφής

$$\frac{\mu^2 + 1}{2}, \frac{\mu^2 - 1}{2}, \mu, \quad \text{όπου } \mu \text{ περιττός } (\mu = 3, 5, 7, \dots)$$

σχηματίζουν μια Πυθαγόρεια τριάδα.

α) Μπορείτε να το αποδείξετε;

β) Να βρείτε δύο τουλάχιστον Πυθαγόρειες τριάδες με τους αριθμούς του Πυθαγόρα.



Πλάτωνας

Ο Πλάτωνας (5ος - 4ος αιώνας π.Χ.) γνώριζε ότι οι αριθμοί της μορφής

$$\frac{\mu^2}{4} + 1, \frac{\mu^2}{4} - 1, \mu, \quad \text{όπου } \mu \text{ άρτιος } (\mu = 4, 6, 8, \dots)$$

σχηματίζουν μια Πυθαγόρεια τριάδα.

α) Μπορείτε να το αποδείξετε;

β) Να βρείτε δύο τουλάχιστον Πυθαγόρειες τριάδες με τους αριθμούς του Πλάτωνα.



Ευκλείδης

Ο Διόφαντος (3ος αιώνας μ.Χ.) στηριζόμενος σε μία ταυτότητα την οποία γνώριζε και ο Ευκλείδης, έδωσε μια γενικότερη λύση στο πρόβλημα κατασκευής Πυθαγορείων τριάδων από οποιουδήποτε αριθμούς (άρτιους ή περιττούς). Ανακάλυψε ότι οι αριθμοί της μορφής $l^2 + \mu^2$, $l^2 - \mu^2$, 2μ , όπου l , μ θετικοί άνισοι ακέραιοι αριθμοί, σχηματίζουν Πυθαγόρεια τριάδα.

α) Μπορείτε να το αποδείξετε;

β) Να βρείτε δύο τουλάχιστον Πυθαγόρειες τριάδες με τους αριθμούς του Διόφαντου.

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Η έννοια της απόδειξης

- Διερεύνηση του ρόλου της απόδειξης στην καθημερινή ζωή (δικαστήριο, εμπορικές συναλλαγές κ.τ.λ.)
- Η απόδειξη στα Μαθηματικά και στις άλλες επιστήμες (ευθεία απόδειξη, απαγωγή σε άτοπο κ.τ.λ.).

1.6

Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων



✓ Μαθαίνω να μετατρέπω μια αλγεβρική παράσταση σε γινόμενο παραγόντων




ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1. Να γίνουν οι πράξεις:

α) $7,32 \cdot 25 + 7,32 \cdot 75$ β) $347 \cdot \frac{7}{6} - 347 \cdot \frac{1}{6}$

2. Σε μια κυκλική πλατεία ακτίνας $R = 32,50$ m κατασκευάστηκε ένα κυκλικό συντριβάνι ακτίνας $\rho = 7,50$ m.
Να υπολογίσετε το εμβαδόν της πλατείας που απέμεινε μετά την κατασκευή του συντριβανιού.



Πολλές φορές, για την επίλυση ενός προβλήματος, μιας εξίσωσης, μιας ανίσωσης ή για την απλοποίηση ενός κλάσματος, είναι χρήσιμο να μετατραπεί μία παράσταση από άθροισμα σε γινόμενο.

Η διαδικασία με την οποία μια παράσταση, που είναι άθροισμα, μετατρέπεται σε γινόμενο παραγόντων, λέγεται **παραγοντοποίηση**.

Για παράδειγμα, η παράσταση $\pi R^2 - \pi \rho^2$ με τη βοήθεια της επιμεριστικής ιδιότητας γράφεται $\pi(R^2 - \rho^2)$ και σύμφωνα με την ταυτότητα $(R + \rho)(R - \rho) = R^2 - \rho^2$, παραγοντοποιείται ως εξής:

$$nR^2 - n\rho^2 = n(R^2 - \rho^2) = n(R + \rho)(R - \rho)$$

Στο προηγούμενο παράδειγμα η παράσταση $\pi(R + \rho)(R - \rho)$ δεν επιδέχεται περαιτέρω παραγοντοποίηση και γι' αυτό λέμε ότι η παράσταση έχει αναλυθεί σε **γινόμενο πρώτων παραγόντων**.

Στο εξής, όταν λέμε ότι παραγοντοποιούμε μία παράσταση, θα εννούμε ότι την αναλύουμε σε γινόμενο πρώτων παραγόντων.

Στη συνέχεια, θα δούμε τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις παραγοντοποίησης μιας αλγεβρικής παράστασης.

α) Κοινός παράγοντας

Αν όλοι οι όροι μιας παράστασης έχουν κοινό παράγοντα, τότε η παράσταση μετατρέπεται σε γινόμενο παραγόντων σύμφωνα με την επιμεριστική ιδιότητα.

$$3a + 3b - 3\gamma = 3(a + b - \gamma)$$

παραγοντοποιούμε
αναπτύσσουμε

Για παράδειγμα, σε όλους τους όρους της παράστασης $3a + 3b - 3\gamma$ υπάρχει κοινός παράγοντας το 3, οπότε η παράσταση παραγοντοποιείται ως εξής:

$$3a + 3b - 3\gamma = 3(a + b - \gamma).$$

Ομοίως η παράσταση $2a^2 - 2ab + 2a$, γράφεται $2a \cdot a - 2a \cdot b + 2a \cdot 1$, οπότε σε όλους τους όρους της υπάρχει κοινός παράγοντας το $2a$.

Άρα, η παράσταση παραγοντοποιείται ως εξής:

$$2a^2 - 2ab + 2a = 2a(a - b + 1).$$

Στην περίπτωση αυτή, λέμε ότι «βγάζουμε κοινό παράγοντα το $2a$ ».

Κάθε όρος μέσα στην παρένθεση είναι το πηλίκο της διαίρεσης των αντίστοιχων όρων της παράστασης με τον κοινό παράγοντα:

$$(2a^2) : (2a) = \frac{2a^2}{2a} = a$$

$$(2ab) : (2a) = \frac{2ab}{2a} = b$$

$$(2a) : (2a) = \frac{2a}{2a} = 1$$

Παραδείγματα

Να παραγοντοποιηθούν οι παραστάσεις:

α) $12x^2y - 30xy^2 + 6x^2y^2$ β) $a(\omega - x) + 3\beta(x - \omega)$ γ) $3(2x - 1) + x(4x - 2)$

Λύση

α) Σε όλους τους όρους της παράστασης υπάρχει κοινός παράγοντας το $6xy$, οπότε έχουμε:

$$12x^2y - 30xy^2 + 6x^2y^2 = 6xy(2x - 5y + xy)$$

β) Η παράσταση έχει δύο όρους, τους $a(\omega - x)$ και $3\beta(x - \omega)$. Για να δημιουργήσουμε και στους δύο όρους κοινό παράγοντα τον $\omega - x$, το δεύτερο όρο της τον γράφουμε $-3\beta(\omega - x)$, οπότε έχουμε:

$$\begin{aligned} a(\omega - x) + 3\beta(x - \omega) &= \\ a(\omega - x) - 3\beta(\omega - x) &= \\ (\omega - x)(a - 3\beta) &= \end{aligned}$$

γ) Αν από το δεύτερο όρο της παράστασης βγάλουμε κοινό παράγοντα το 2, τότε δημιουργούμε κοινό παράγοντα το $2x - 1$, οπότε έχουμε:

$$\begin{aligned} 3(2x - 1) + x(4x - 2) &= \\ 3(2x - 1) + 2x(2x - 1) &= \\ (2x - 1)(3 + 2x) &= \end{aligned}$$

β) Κοινός παράγοντας κατά ομάδες (Ομαδοποίηση)

Στην παράσταση $ax + ay + 2x + 2y$, δεν υπάρχει κοινός παράγοντας σε όλους τους όρους της. Αν όμως βγάλουμε κοινό παράγοντα, από τους δύο πρώτους όρους το a και

από τους δύο τελευταίους το 2, τότε σχηματίζονται δύο όροι με κοινό παράγοντα τον $x + y$. Έτσι, η παράσταση παραγοντοποιείται ως εξής:

$$\underbrace{ax + ay}_{x+y} + \underbrace{2x + 2y}_{x+y} = a(x + y) + 2(x + y) = (x + y)(a + 2)$$

Την προηγούμενη παράσταση μπορούμε να τη χωρίσουμε και σε διαφορετικές ομάδες. Το αποτέλεσμα όμως της παραγοντοποίησης είναι και πάλι το ίδιο. Πράγματι, έχουμε:

$$\underbrace{ax + 2x}_{x(a+2)} + \underbrace{ay + 2y}_{y(a+2)} = x(a + 2) + y(a + 2) = (a + 2)(x + y)$$

Παραδείγματα

Να παραγοντοποιηθούν οι παραστάσεις:

α) $3x^3 - 12x^2 + 5x - 20$ β) $a\beta - 3a - 3\beta + 9$ γ) $3x^2 + 5xy + 2y^2$

Λύση

α) $3x^3 - 12x^2 + 5x - 20 = 3x^2(x - 4) + 5(x - 4) = (x - 4)(3x^2 + 5)$

β) $a\beta - 3a - 3\beta + 9 = a(\beta - 3) - 3(\beta - 3) = (\beta - 3)(a - 3)$

γ) $3x^2 + 5xy + 2y^2 = 3x^2 + 3xy + 2xy + 2y^2 =$
 $= 3x(x + y) + 2y(x + y) =$
 $= (x + y)(3x + 2y).$

Μερικές παραστάσεις παραγοντοποιούνται κατά ομάδες, αν **διασπάσουμε** κατάλληλα έναν ή περισσότερους όρους
 π.χ. $5xy = 3xy + 2xy$

γ) Διαφορά τετραγώνων

Αν εναλλάξουμε τα μέλη της ταυτότητας

$(a + \beta)(a - \beta) = a^2 - \beta^2$, τότε γράφεται και ως εξής:

$$a^2 - \beta^2 = (a + \beta)(a - \beta)$$

Σύμφωνα με την ταυτότητα αυτή, μπορούμε να παραγοντοποιήσουμε μια παράσταση που είναι διαφορά τετραγώνων, π.χ. $a^2 - 9 = a^2 - 3^2 = (a + 3)(a - 3)$.

Παραδείγματα

Να παραγοντοποιηθούν οι παραστάσεις: α) $4\beta^2 - 25$ β) $(3x - 1)^2 - 81$ γ) $a^2 - 7$.

Λύση

α) $4\beta^2 - 25 = (2\beta)^2 - 5^2 = (2\beta + 5)(2\beta - 5)$

β) $(3x - 1)^2 - 81 = (3x - 1)^2 - 9^2 =$
 $= (3x - 1 + 9)(3x - 1 - 9) =$
 $= (3x + 8)(3x - 10)$

γ) $a^2 - 7 = a^2 - (\sqrt{7})^2 = (a - \sqrt{7})(a + \sqrt{7})$

Για να σχηματίσουμε διαφορά τετραγώνων εκφράζουμε κάθε όρο ως τετράγωνο μιας παράστασης.

δ) Διαφορά – άθροισμα κύβων

Οι ταυτότητες $(a - b)(a^2 + ab + b^2) = a^3 - b^3$ και $(a + b)(a^2 - ab + b^2) = a^3 + b^3$ γράφονται και ως εξής:

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2) \quad a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

Σύμφωνα με τις ταυτότητες αυτές, μπορούμε να παραγοντοποιήσουμε μια παράσταση που είναι διαφορά ή άθροισμα κύβων, π.χ.

$$x^3 - 64 = x^3 - 4^3 = (x - 4)(x^2 + x \cdot 4 + 4^2) = (x - 4)(x^2 + 4x + 16)$$

$$y^3 + 27 = y^3 + 3^3 = (y + 3)(y^2 - y \cdot 3 + 3^2) = (y + 3)(y^2 - 3y + 9)$$

Παραδείγματα

Να παραγοντοποιηθούν οι παραστάσεις: α) $x^3 - 27$ β) $x^3 + 64$ γ) $8a^3 - b^3$

Λύση

$$\begin{aligned} \alpha) \quad x^3 - 27 &= x^3 - 3^3 = (x - 3)(x^2 + x \cdot 3 + 3^2) = \\ &= (x - 3)(x^2 + 3x + 9) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \beta) \quad x^3 + 64 &= x^3 + 4^3 = (x + 4)(x^2 - x \cdot 4 + 4^2) = \\ &= (x + 4)(x^2 - 4x + 16) \end{aligned}$$

$$\gamma) \quad 8a^3 - b^3 = (2a)^3 - b^3 = (2a - b)[(2a)^2 + 2a \cdot b + b^2] = (2a - b)(4a^2 + 2ab + b^2)$$

Για να σχηματίσουμε διαφορά ή άθροισμα κύβων εκφράζουμε κάθε όρο ως κύβο μιας παράστασης.

ε) Ανάπτυγμα τετραγώνου

Οι ταυτότητες $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ και $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ γράφονται και ως εξής:

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2 \quad a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$

Σύμφωνα με τις ταυτότητες αυτές, μπορούμε να παραγοντοποιήσουμε μια παράσταση που είναι ανάπτυγμα τετραγώνου (**τέλειο τετράγωνο**), π.χ.

$$x^2 + 4x + 4 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 2 + 2^2 = (x + 2)^2$$

$$y^2 - 6y + 9 = y^2 - 2 \cdot y \cdot 3 + 3^2 = (y - 3)^2$$

Οι παραστάσεις $(x + 2)^2$ και $(y - 3)^2$ είναι γινόμενα παραγόντων, αφού $(x + 2)^2 = (x + 2)(x + 2)$ και $(y - 3)^2 = (y - 3)(y - 3)$

Παραδείγματα

Να παραγοντοποιηθούν οι παραστάσεις:

α) $4a^2 + 12a + 9$ β) $a^2 - 10ab + 25b^2$ γ) $-4y^2 + 4y - 1$

Λύση

$$\alpha) \quad 4a^2 + 12a + 9 = (2a)^2 + 2 \cdot 2a \cdot 3 + 3^2 = (2a + 3)^2$$

$$\beta) \alpha^2 - 10\alpha\beta + 25\beta^2 = \alpha^2 - 2 \cdot \alpha \cdot 5\beta + (5\beta)^2 = (\alpha - 5\beta)^2$$

$$\gamma) -4y^2 + 4y - 1 = -(4y^2 - 4y + 1) = \\ = -[(2y)^2 - 2 \cdot 2y \cdot 1 + 1^2] = \\ = -(2y - 1)^2$$

Γράφουμε κάθε παράσταση ως ανάπτυγμα τετραγώνου της μορφής $\alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2$ ή $\alpha^2 - 2\alpha\beta + \beta^2$

στ) Παραγοντοποίηση τριωνύμου της μορφής $x^2 + (\alpha + \beta)x + \alpha\beta$

Το ανάπτυγμα του γινομένου $(x + \alpha)(x + \beta)$ είναι το τριώνυμο $x^2 + (\alpha + \beta)x + \alpha\beta$, αφού

$$(x + \alpha)(x + \beta) = x^2 + \alpha x + \beta x + \alpha\beta = x^2 + (\alpha + \beta)x + \alpha\beta.$$

Επομένως, ένα τριώνυμο της μορφής $x^2 + (\alpha + \beta)x + \alpha\beta$

παραγοντοποιείται σύμφωνα με τον τύπο

$$x^2 + (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = (x + \alpha)(x + \beta)$$

Για παράδειγμα, για να παραγοντοποιήσουμε το τριώνυμο $x^2 + 8x + 12$ αναζητούμε δύο αριθμούς με γινόμενο 12 (σταθερός όρος) και άθροισμα 8 (συντελεστής του x).

Υπάρχουν πολλά ζευγάρια αριθμών που έχουν γινόμενο 12 (π.χ. $1 \cdot 12$, $2 \cdot 6$, $3 \cdot 4$ κ.τ.λ.).

Όμως, μόνο το ζευγάρι 2 και 6 έχει άθροισμα 8. Άρα έχουμε:

$$x^2 + 8x + 12 = x^2 + (6 + 2)x + 6 \cdot 2 = (x + 6)(x + 2)$$

Παραδείγματα

Να παραγοντοποιηθούν τα τριώνυμα:

$$\alpha) x^2 - 8x + 12 \quad \beta) x^2 + 5x - 6 \quad \gamma) -3y^2 + 12y - 9$$

Λύση

α) Για να παραγοντοποιήσουμε το τριώνυμο $x^2 - 8x + 12$, αναζητούμε δύο αριθμούς με γινόμενο 12 και άθροισμα -8 . Οι αριθμοί αυτοί πρέπει να είναι αρνητικοί, αφού έχουν γινόμενο θετικό και άθροισμα αρνητικό. Με δοκιμές βρίσκουμε ότι οι αριθμοί αυτοί είναι το -2 και το -6 .

$$\text{Άρα έχουμε } x^2 - 8x + 12 = (x - 2)(x - 6)$$

$$\begin{array}{c} (-2)+(-6) \\ \uparrow \\ x^2 - 8x + 12 = (x - 2)(x - 6) \\ \downarrow \\ (-2) \cdot (-6) \end{array}$$

β) Για να παραγοντοποιήσουμε το τριώνυμο $x^2 + 5x - 6$, αναζητούμε δύο ετερόσημους αριθμούς, που έχουν γινόμενο -6 και άθροισμα 5.

$$\text{Οι αριθμοί αυτοί είναι το } 6 \text{ και το } -1, \text{ οπότε έχουμε } x^2 + 5x - 6 = (x + 6)(x - 1).$$

γ) Για να παραγοντοποιήσουμε το τριώνυμο $-3y^2 + 12y - 9$, βγάζουμε κοινό παράγοντα το -3 , ώστε ο συντελεστής του y^2 να γίνει 1, οπότε έχουμε

$$-3y^2 + 12y - 9 = -3(y^2 - 4y + 3)$$

Για την παραγοντοποίηση του τριωνύμου $y^2 - 4y + 3$, αναζητούμε δύο αριθμούς με γινόμενο 3 και άθροισμα -4 . Οι αριθμοί αυτοί είναι το -3 και το -1 , οπότε έχουμε $-3y^2 + 12y - 9 = -3(y^2 - 4y + 3) = -3(y - 3)(y - 1)$.




ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- 1** α) Να παραγοντοποιηθεί η παράσταση $3x^2 - 18x$.
β) Να λυθεί η εξίσωση $3x^2 = 18x$.

Λύση

- α) Η παράσταση $3x^2 - 18x$ παραγοντοποιείται ως εξής: $3x^2 - 18x = 3x(x - 6)$.
β) Η εξίσωση $3x^2 = 18x$ γράφεται $3x^2 - 18x = 0$ και σύμφωνα με το προηγούμενο ερώτημα έχουμε $3x(x - 6) = 0$. Για να είναι το γινόμενο $3x(x - 6)$ ίσο με το μηδέν, πρέπει $3x = 0$ ή $x - 6 = 0$, δηλαδή $x = 0$ ή $x = 6$.


2



Αν τοποθετήσουμε κατάλληλα τα τέσσερα σχήματα, σχηματίζουμε ένα ορθογώνιο.
Να βρεθούν οι διαστάσεις του ορθογωνίου.

Λύση

Το ορθογώνιο που θα σχηματιστεί θα έχει εμβαδόν E , ίσο με το άθροισμα των εμβαδών των τεσσάρων σχημάτων, δηλαδή, $E = x \cdot 1 + y \cdot 1 + xy + 1 \cdot 1 = x + y + xy + 1$.
Όμως, $x + y + xy + 1 = (x + xy) + (y + 1) =$
 $= x(1 + y) + (1 + y) = (1 + y)(x + 1)$.
Άρα, οι διαστάσεις του ορθογωνίου είναι $1 + y$ και $1 + x$.



3

Να υπολογιστούν οι αριθμητικές παραστάσεις χωρίς να χρησιμοποιηθεί υπολογιστής τσέπης:

- α) $786 \cdot 45 + 786 \cdot 55$ β) $2005^2 - 1995^2$ γ) $565 \cdot 499 + 565 \cdot 66 - 435^2$.

Λύση

- α) $786 \cdot 45 + 786 \cdot 55 = 786(45 + 55) = 786 \cdot 100 = 78600$
β) $2005^2 - 1995^2 = (2005 - 1995)(2005 + 1995) = 10 \cdot 4000 = 40000$
γ) $565 \cdot 499 + 565 \cdot 66 - 435^2 = 565(499 + 66) - 435^2 = 565^2 - 435^2 =$
 $(565 - 435)(565 + 435) = 130 \cdot 1000 = 130000$

4

Να αναλυθούν σε γινόμενο παραγόντων οι παραστάσεις:

- α) $3x^2y - 12y^3$ β) $5x^2y + 10x^2 + 5xy + 10x$ γ) $x^4 - 16y^4$
δ) $16\alpha^3\beta - 54\beta$ ε) $x^2 - 4x + 4 - y^2$ στ) $3x^3 + 12x^2 - 15x$

Λύση

- α) $3x^2y - 12y^3 = 3y(x^2 - 4y^2) = 3y[x^2 - (2y)^2] = 3y(x - 2y)(x + 2y)$
β) $5x^2y + 10x^2 + 5xy + 10x = 5x(xy + 2x + y + 2) = 5x[y(x + 1) + 2(x + 1)] =$
 $= 5x(x + 1)(y + 2)$

$$\gamma) x^4 - 16y^4 = (x^2)^2 - (4y^2)^2 = (x^2 + 4y^2)(x^2 - 4y^2) = (x^2 + 4y^2) [x^2 - (2y)^2] = (x^2 + 4y^2)(x - 2y)(x + 2y)$$

$$\delta) 16a^3\beta - 54\beta = 2\beta(8a^3 - 27) = 2\beta[(2a)^3 - 3^3] = 2\beta(2a - 3)(4a^2 + 6a + 9)$$

$$\epsilon) x^2 - 4x + 4 - y^2 = (x^2 - 2 \cdot x \cdot 2 + 2^2) - y^2 = (x - 2)^2 - y^2 = (x - 2 + y)(x - 2 - y).$$

$$\sigma\tau) 3x^3 + 12x^2 - 15x = 3x(x^2 + 4x - 5)$$

Το τριώνυμο $x^2 + 4x - 5$ παραγοντοποιείται, εφόσον υπάρχουν αριθμοί με γινόμενο -5 και άθροισμα 4 , που είναι οι 5 και -1 .

$$\text{Άρα, } 3x^3 + 12x^2 - 15x = 3x(x^2 + 4x - 5) = 3x(x + 5)(x - 1).$$



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ


- 1 Ποιες από τις παρακάτω παραστάσεις είναι γινόμενο παραγόντων;
- α) $2(x - y)(x + y)$ β) $2 + (x - y)(x + y)$ γ) $4(a - \beta)^2$ δ) $4 + (a - \beta)^2$
 ε) $(x + 2y)x - y$ στ) $(x + 2y)(x - y)$ ζ) $(a + \beta)(a + 3\beta)$
 η) $(a + \beta)(a + 3\beta) + 1$.

- 2 Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω ισότητες.
- α) $8x + 16 = 8(\dots\dots\dots)$ β) $3ay - y^2 = y(\dots\dots\dots)$
 γ) $6x^2 + 12x = \dots\dots\dots(x + 2)$ δ) $-4x^2 + 8x = -4x(\dots\dots\dots)$
 ε) $\sqrt{2}x + \sqrt{2} = \sqrt{2}(\dots\dots\dots)$ στ) $(x - 1)^2 - (x - 1) = (x - 1)(\dots\dots\dots)$

- 3 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
 Η παράσταση $3x^3 + 3x^2 + x + 1$ παραγοντοποιείται ως εξής:
- α) $3x^2(x + 1)$ β) $(x + 3)(3x^2 - 1)$ γ) $(x + 1)(3x^2 + 1)$ δ) $x(3x^2 + x + 1)$.

- 4 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω ισότητες με (Σ), αν είναι σωστές ή με (Λ), αν είναι λανθασμένες.
- α) $x^2 - 2^2 = (x - 2)(x + 2)$ β) $x^2 - 9 = (x - 9)(x + 9)$
 γ) $112^2 - 12^2 = 100 \cdot 124$ δ) $4y^2 - 1 = (4y - 1)(4y + 1)$
 ε) $4x^2 - a^2 = (2x - a)(2x + a)$ στ) $a^2 - (\beta - 1)^2 = (a + \beta - 1)(a - \beta - 1)$

- 5 Αν ισχυριστούμε ότι το εμβαδόν του πράσινου μέρους είναι $(x - y)(x + y)$, αυτό είναι σωστό ή λάθος; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.



- 6 Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω ισότητες.
- α) $a^3 - 2^3 = (a - 2)(\dots\dots\dots)$
 β) $a^3 + 3^3 = (a + 3)(\dots\dots\dots)$
 γ) $(2x)^3 - 1 = (2x - 1)(\dots\dots\dots)$
 δ) $1 + (5y)^3 = (1 + 5y)(\dots\dots\dots)$

7 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω ισότητες με (Σ), αν είναι σωστές ή με (Λ), αν είναι λανθασμένες.

α) $x^3 - 5^3 = (x - 5)(x^2 - 5x + 25)$

β) $8 + a^3 = (2 + a)(2^2 - 2a + a^2)$

γ) $(3y)^3 + 1 = (3y + 1)(3y^2 - 3y + 1)$

δ) $1 - (2\beta)^3 = (1 - 2\beta)(1 + 2\beta + 4\beta^2)$

8 Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω ισότητες.

α) $x^2 + 6x + 9 = (\dots\dots\dots)^2$

β) $4a^2 - 4a + 1 = (\dots\dots\dots)^2$

γ) $y^4 - 2y^2 + 1 = (\dots\dots\dots)^2$

δ) $25 + 10x^3 + x^6 = (\dots\dots\dots)^2$

9 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση

Ο κύκλος εμβαδού $\pi a^2 + 2\pi a + \pi$, με $a > 0$, έχει ακτίνα

α) $a + 2$

β) $a^2 + 1$

γ) $a + 1$

δ) $\pi(a + 1)$

10 Να συμπληρώσετε τον πίνακα.

$x^2 + (a + \beta)x + a\beta$	$a\beta$	$a + \beta$	a	β	$(x + a)(x + \beta)$
$x^2 + 3x + 2$					
$x^2 - 3x + 2$					
$x^2 + 5x - 6$					
$x^2 + 5x + 6$					
$x^2 - x - 2$					
$x^2 + x - 2$					

11 Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω ισότητες.

α) $x^2 + (a + 2)x + 2a = (x + \dots\dots) \cdot (x + \dots\dots)$

β) $x^2 + (\sqrt{2} + \sqrt{3})x + \sqrt{6} = (x + \dots\dots) \cdot (x + \dots\dots)$



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

1 Να παραγοντοποιήσετε τις παραστάσεις:

α) $3a + 6\beta$

β) $2x - 8$

γ) $8\omega^2 + 6\omega$

δ) $-9x^2 - 6x$

ε) $8a^2\beta + 4a\beta^2$

στ) $2x^2 - 2xy + 2x$

ζ) $a^2\beta + a\beta^2 - a\beta$

η) $2a^3 - 4a^2 + 6a^2\beta$

θ) $\sqrt{2}xy - \sqrt{18}y + \sqrt{8}y^2$

2 Να παραγοντοποιήσετε τις παραστάσεις:

α) $x(a - \beta) + y(a - \beta)$

β) $a(x + y) + \beta(x + y)$

γ) $(3x - 1)(x - 2) - (x + 4)(x - 2)$

δ) $a^2(a - 2) - 3(2 - a)$

ε) $4x(x - 1) - x + 1$

στ) $2x^2(x - 3) - 6x(x - 3)^2$

- 3 i) Να παραγοντοποιήσετε τις παραστάσεις:
 α) $x^2 + x$ β) $2y^2 - 5y$ γ) $\omega(\omega - 3) - 2(3 - \omega)$ δ) $\alpha(3\alpha + 1) - 4\alpha$

ii) Να επιλύσετε τις εξισώσεις:

- α) $x^2 + x = 0$ β) $2y^2 = 5y$ γ) $\omega(\omega - 3) - 2(3 - \omega) = 0$ δ) $\alpha(3\alpha + 1) = 4\alpha$

- 4 Να παραγοντοποιήσετε τις παραστάσεις:

- α) $x^2 + xy + ax + ay$ β) $x^3 - x^2 + x - 1$ γ) $x^3 - 5x^2 + 4x - 20$
 δ) $2x^3 - 3x^2 + 4x - 6$ ε) $4x^2 - 8x - ax + 2a$ στ) $9\alpha\beta - 18\beta^2 + 10\beta - 5\alpha$
 ζ) $12x^2 - 8xy - 15x + 10y$ η) $x^3 + \sqrt{2}x^2 + x + \sqrt{2}$ θ) $\sqrt{6}x^2 + 2\sqrt{2}x - \sqrt{3}x - 2$

- 5 Να παραγοντοποιήσετε τις παραστάσεις:

- α) $7a^2 + 10ab + 3b^2$ β) $5x^2 - 8xy + 3y^2$ γ) $3x^2 - xy - 2y^2$

- 6 α) Να αναλύσετε σε γινόμενο παραγόντων την παράσταση $a^2\beta + \alpha\beta^2 - \alpha - \beta$.
 β) Αν για τους αριθμούς α, β ισχύει $\alpha^2\beta + \alpha\beta^2 = \alpha + \beta$, να αποδείξετε ότι οι αριθμοί α, β είναι αντίθετοι ή αντίστροφοι.

- 7 Να παραγοντοποιήσετε τις παραστάσεις:

- α) $2a^2 - 2a + \alpha\beta - \beta + ax - x$ β) $2\alpha\beta - 4\beta + 5\alpha - 10 + 2\alpha\gamma - 4\gamma$

- 8 Να παραγοντοποιήσετε τις παραστάσεις:


- α) $x^2 - 9$ β) $16x^2 - 1$ γ) $\alpha^2 - 9\beta^2$
 δ) $\alpha^2\beta^2 - 4$ ε) $36\omega^2 - (\omega + 5)^2$ στ) $4(x + 1)^2 - 9(x - 2)^2$
 ζ) $\frac{1}{x^2} - 16$ η) $x^2 - 3$ θ) $x^2 - 2y^2$

- 9 Να παραγοντοποιήσετε τις παραστάσεις:

- α) $2x^2 - 32$ β) $28 - 7y^2$ γ) $2x^3 - 2x$ δ) $5ax^2 - 80a$ ε) $2(x - 1)^2 - 8$

- 10 Στο ορθογώνιο τρίγωνο ABΓ να υπολογίσετε την πλευρά γ , όταν:

- α) $\alpha = 53, \beta = 28$ β) $\alpha = 0,37, \beta = 0,12$
 γ) $\alpha = 26\lambda, \beta = 10\lambda$



- 11 Να επιλύσετε τις εξισώσεις:

- α) $x^2 - 49 = 0$ β) $9x^3 - 4x = 0$ γ) $x(x + 1)^2 = 4x$ δ) $(x + 2)^3 = x + 2$

- 12 Να παραγοντοποιήσετε τις παραστάσεις:

- α) $x^3 - 27$ β) $y^3 + 8$ γ) $\omega^3 + 64$ δ) $8x^3 - 1$ ε) $27y^3 + 1$

- 13 Να παραγοντοποιήσετε τις παραστάσεις:

- α) $3x^3 - 24$ β) $16\alpha^4 + 2\alpha$ γ) $\frac{4}{3}\pi R^3 - \frac{4}{3}\pi r^3$ δ) $\alpha^4\beta + \alpha\beta^4$

- 14 Να συμπληρώσετε τις ισότητες:

- α) $x^3 - \dots = (x - 3)(\dots + \dots + 9)$ β) $\dots + y^3 = (2x + y)(4x^2 - \dots + \dots)$
 γ) $\alpha^3 - \dots = (\alpha - 2\beta)(\dots + \dots + 4\beta^2)$ δ) $\alpha^3 + \dots = (\alpha + 5\beta)(\dots - \dots + 25\beta^2)$

15 Να παραγοντοποιήσετε τις παραστάσεις:


- α) $x^2 - 2x + 1$ β) $y^2 + 4y + 4$ γ) $\omega^2 - 6\omega + 9$ δ) $a^2 + 10a + 25$
 ε) $1 - 4\beta + 4\beta^2$ στ) $9x^4 + 6x^2 + 1$ ζ) $4y^2 - 12y + 9$ η) $16x^2 + 8xy + y^2$
 θ) $25a^2 - 10ab + \beta^2$ ι) $(a + \beta)^2 - 2(a + \beta) + 1$ ια) $\frac{y^2}{9} - 2y + 9$ ιβ) $x^2 + x + \frac{1}{4}$

16 Να παραγοντοποιήσετε τις παραστάσεις:


- α) $3x^2 + 24x + 48$ β) $-y^2 + 4y - 4$ γ) $2a^2 - 8ab + 8\beta^2$ δ) $4a^3 + 12a^2 + 9a$

17 Να βρείτε:

- α) Ένα πολυώνυμο που να εκφράζει το εμβαδόν του διπλανού σχήματος.
 β) Την πλευρά ενός τετραγώνου που έχει εμβαδόν ίσο με το εμβαδόν του διπλανού σχήματος.



18 Να βρείτε την πλευρά ενός τετραγώνου, που έχει εμβαδόν ίσο με το εμβαδόν του τετραπλεύρου ΑΒΓΔ.



19 Να παραγοντοποιήσετε τα τριώνυμα:

- α) $x^2 + 3x + 2$ β) $y^2 - 4y + 3$ γ) $\omega^2 + 5\omega + 6$ δ) $a^2 + 6a + 5$
 ε) $x^2 - 7x + 12$ στ) $y^2 - y - 12$ ζ) $\omega^2 - 9\omega + 18$ η) $a^2 + 3a - 10$

20 Να παραγοντοποιήσετε τα τριώνυμα:

- α) $x^2 + (2 + \sqrt{3})x + 2\sqrt{3}$ β) $x^2 + (2a + 3\beta)x + 6a\beta$ γ) $x^2 + (3 - \sqrt{2})x - 3\sqrt{2}$

21 Να παραγοντοποιήσετε τις παραστάσεις:

- α) $2\omega^2 + 10\omega + 8$ β) $3a^2 - 12a - 15$ γ) $ax^2 - 7ax + 6a$


22 Να υπολογίσετε τις αριθμητικές παραστάσεις χωρίς να χρησιμοποιήσετε υπολογιστή τσέπης.

- α) $1453 \cdot 1821 - 1453 \cdot 821$ β) $801^2 + 199 \cdot 801$ γ) $998^2 - 4$
 δ) $999 \cdot 1001 + 1$ ε) $999^2 + 2 \cdot 999 + 1$ στ) $97^2 + 6 \cdot 97 + 9$

23 Να παραγοντοποιήσετε τις παραστάσεις:

- α) $x^2y^2 - 4y^2 - x^2 + 4$ β) $x^4 - 1 + x^3 - x$ γ) $x^3(x^2 - 1) + 1 - x^2$
 δ) $(x^2 + 9)^2 - 36x^2$ ε) $a^2 - 2a\beta + \beta^2 - a + \beta$ στ) $x^2 - 2xy + y^2 - \omega^2$
 ζ) $1 - a^2 + 2a\beta - \beta^2$ η) $y^2 - x^2 - 10y + 25$ θ) $2(x-1)(x^2-4) - 5(x-1)(x-2)^2$
 ι) $(y^2 - 4)^2 - (y + 2)^2$ ια) $(a^2 + \beta^2 - \gamma^2)^2 - 4a^2\beta^2$ ιβ) $(x^2+9)(a^2+4) - (ax+6)^2$

24 Ενός ορθογωνίου οικοπέδου οι διαστάσεις x , y μειώθηκαν, επειδή έπρεπε να αυξηθεί το πλάτος των διπλανών δρόμων. Αν το εμβαδόν του οικοπέδου που απέμεινε είναι $xy - x - 2y + 2$, να βρείτε ποια θα μπορούσε να είναι η μείωση κάθε διάστασής του.



1.7 Διαίρεση πολυωνύμων



✓ Μαθαίνω να βρίσκω το πηλίκο και το υπόλοιπο της διαίρεσης ενός πολυωνύμου $\Delta(x)$ με το πολυώνυμο $\delta(x)$.

✓ Μαθαίνω να γράφω την ταυτότητα της Ευκλείδειας διαίρεσης του $\Delta(x)$ με το $\delta(x)$.



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1. Αν τοποθετήσουμε σε μια αίθουσα 325 καθίσματα σε σειρές και κάθε σειρά περιέχει 19 καθίσματα, πόσες σειρές θα σχηματίσουμε και πόσα καθίσματα θα περισσέψουν; Να γράψετε την ισότητα της Ευκλείδειας διαίρεσης.
2. Να βρείτε το πολυώνυμο $\Delta(x)$ το οποίο διαιρούμενο με το πολυώνυμο $\delta(x) = x^2 - x$, δίνει πηλίκο $\pi(x) = 2x^2 - 3x - 1$ και υπόλοιπο $u(x) = 7x - 4$.

Ξέρουμε ότι, αν έχουμε δύο φυσικούς αριθμούς Δ (διαιρετέος) και δ (διαιρέτης) με $\delta \neq 0$ και κάνουμε τη διαίρεση $\Delta : \delta$, τότε βρίσκουμε δύο μοναδικούς φυσικούς αριθμούς π (πηλίκο) και u (υπόλοιπο), για τους οποίους ισχύει:

$$\Delta = \delta\pi + u \quad \text{με} \quad u < \delta$$

Αν $u = 0$, είναι $\Delta = \delta \cdot \pi$ και τότε λέμε ότι έχουμε **τέλεια διαίρεση**.

Στην περίπτωση αυτή λέμε ακόμα ότι ο δ **διαιρεί** το Δ ή ότι ο δ είναι **παράγοντας** του Δ .

Για παράδειγμα, αν $\Delta = 325$ και $\delta = 19$, τότε με τη διαίρεση $325 : 19$, βρίσκουμε τους αριθμούς $\pi = 17$ και $u = 2$, για τους οποίους ισχύει

$$325 = 19 \cdot 17 + 2 \quad \text{με} \quad 2 < 19$$

$$\begin{array}{r|l} 325 & 19 \\ -19 & 17 \\ \hline 135 & \\ -133 & \\ \hline 2 & \end{array}$$

Ομοίως, αν έχουμε δύο πολυώνυμα $\Delta(x)$ (διαιρετέος) και $\delta(x)$ (διαιρέτης) με $\delta(x) \neq 0$ και κάνουμε τη διαίρεση $\Delta(x) : \delta(x)$, τότε βρίσκουμε ένα μοναδικό ζεύγος πολυωνύμων $\pi(x)$ (πηλίκο) και $u(x)$ (υπόλοιπο), για τα οποία ισχύει:

$$\Delta(x) = \delta(x)\pi(x) + u(x) \quad (\text{Ταυτότητα Ευκλείδειας διαίρεσης})$$

όπου το $u(x)$ ή είναι ίσο με μηδέν ή έχει βαθμό μικρότερο από το βαθμό του $\delta(x)$.

Στο παράδειγμα που ακολουθεί, περιγράφεται η διαδικασία της διαίρεσης του πολυωνύμου $\Delta(x) = 2x^2 - 5x^3 + 2x^4 - 4 + 8x$ με το πολυώνυμο $\delta(x) = x^2 - x$.

Γράφουμε τα πολυώνυμα του διαιρετέου και του διαιρέτη κατά τις φθίνουσες δυνάμεις της μεταβλητής του x .

$$2x^4 - 5x^3 + 2x^2 + 8x - 4 \quad \left| \begin{array}{l} x^2 - x \\ \hline \end{array} \right.$$

Διαιρούμε τον πρώτο όρο $2x^4$ του διαιρετέου με τον πρώτο όρο x^2 του διαιρέτη ($\frac{2x^4}{x^2} = 2x^2$)
Το αποτέλεσμα $2x^2$ είναι ο πρώτος όρος του πηλίκου.

$$2x^4 - 5x^3 + 2x^2 + 8x - 4 \quad \left| \begin{array}{l} x^2 - x \\ \hline 2x^2 \\ \hline \end{array} \right.$$

Πολλαπλασιάζουμε το $2x^2$, που είναι ο πρώτος όρος του πηλίκου, με το διαιρέτη $x^2 - x$ και το γινόμενο $2x^2(x^2 - x) = 2x^4 - 2x^3$ το αφαιρούμε από το διαιρετέο. Για να γίνουν ευκολότερα οι πράξεις, αλλάζουμε τα πρόσημα και αντί για αφαίρεση κάνουμε πρόσθεση και έτσι βρίσκουμε το **πρώτο μερικό υπόλοιπο**

$$u_1 = -3x^3 + 2x^2 + 8x - 4.$$

$$\begin{array}{r} 2x^4 - 5x^3 + 2x^2 + 8x - 4 \\ -2x^4 + 2x^3 \\ \hline -3x^3 + 2x^2 + 8x - 4 \end{array} \quad \left| \begin{array}{l} x^2 - x \\ \hline 2x^2 \\ \hline \end{array} \right.$$

Στη συνέχεια διαιρούμε τον πρώτο όρο $-3x^3$ του υπολοίπου u_1 με τον πρώτο όρο x^2 του διαιρέτη ($-\frac{3x^3}{x^2} = -3x$). Το αποτέλεσμα $-3x$ είναι ο δεύτερος όρος του πηλίκου.

$$\begin{array}{r} 2x^4 - 5x^3 + 2x^2 + 8x - 4 \\ -2x^4 + 2x^3 \\ \hline -3x^3 + 2x^2 + 8x - 4 \end{array} \quad \left| \begin{array}{l} x^2 - x \\ \hline 2x^2 - 3x \\ \hline \end{array} \right.$$

Πολλαπλασιάζουμε το $-3x$, που είναι ο δεύτερος όρος του πηλίκου, με το διαιρέτη $x^2 - x$ και το γινόμενο $-3x(x^2 - x) = -3x^3 + 3x^2$ το αφαιρούμε από το υπόλοιπο u_1 και βρίσκουμε το **δεύτερο μερικό υπόλοιπο** $u_2 = -x^2 + 8x - 4$.

$$\begin{array}{r} 2x^4 - 5x^3 + 2x^2 + 8x - 4 \\ -2x^4 + 2x^3 \\ \hline -3x^3 + 2x^2 + 8x - 4 \\ \quad 3x^3 - 3x^2 \\ \hline \quad -x^2 + 8x - 4 \end{array} \quad \left| \begin{array}{l} x^2 - x \\ \hline 2x^2 - 3x \\ \hline \end{array} \right.$$

Συνεχίζουμε τη διαίρεση με τον ίδιο τρόπο μέχρι να καταλήξουμε σε υπόλοιπο που να είναι ίσο με μηδέν (**τέλεια διαίρεση**) ή να έχει βαθμό μικρότερο από το βαθμό του διαιρέτη $x^2 - x$ (**ατελής διαίρεση**), οπότε η διαίρεση δεν μπορεί να συνεχιστεί.

$$\begin{array}{r} 2x^4 - 5x^3 + 2x^2 + 8x - 4 \\ -2x^4 + 2x^3 \\ \hline -3x^3 + 2x^2 + 8x - 4 \\ \quad 3x^3 - 3x^2 \\ \hline \quad -x^2 + 8x - 4 \\ \quad \quad x^2 - x \\ \hline \quad \quad \quad 7x - 4 \end{array} \quad \left| \begin{array}{l} x^2 - x \\ \hline 2x^2 - 3x - 1 \\ \hline \end{array} \right.$$

Στο προηγούμενο παράδειγμα, η ταυτότητα της Ευκλείδειας διαίρεσης είναι:

$$2x^4 - 5x^3 + 2x^2 + 8x - 4 = (x^2 - x) \cdot (2x^2 - 3x - 1) + (7x - 4)$$

$$(\text{Διαιρετέος}) = (\text{Διαιρέτης}) \cdot (\text{πηλίκο}) + (\text{υπόλοιπο})$$

Παρατηρούμε ότι το άθροισμα των βαθμών διαιρέτη και πηλίκου είναι ίσο με το βαθμό του διαιρετέου.

Ομοίως η διαίρεση $(8x^4 + 8x^3 + 17x - 5) : (2x^2 + 3x - 1)$, γίνεται ως εξής:

Από το διαιρετέο λείπει ο όρος 2ου βαθμού, οπότε, όταν τον γράφουμε κατά τις φθίνουσες δυνάμεις της μεταβλητής του, συνήθως τον συμπληρώνουμε με το μηδενικό μονώνυμο ή αφήνουμε τη θέση του κενή για να γίνει ευκολότερα η αναγωγή ομοίων όρων.

$$\begin{array}{r|l} 8x^4 + 8x^3 & + 17x - 5 \\ -8x^4 - 12x^3 + 4x^2 & \\ \hline -4x^3 + 4x^2 + 17x - 5 & \\ + 4x^3 + 6x^2 - 2x & \\ \hline 10x^2 + 15x - 5 & \\ -10x^2 - 15x + 5 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

Στην τελευταία διαίρεση, όπου το υπόλοιπο είναι μηδέν, η ταυτότητα της Ευκλείδειας διαίρεσης είναι:

$$\begin{array}{l} 8x^4 + 8x^3 + 17x - 5 = (2x^2 + 3x - 1) \cdot (4x^2 - 2x + 5) \\ (\text{Διαιρετέος}) \quad = (\text{Διαιρέτης}) \quad \cdot (\text{Πηλίκο}) \end{array}$$

Τα πολυώνυμα $\delta = 2x^2 + 3x - 1$ και $\pi = 4x^2 - 2x + 5$ λέγονται **παράγοντες** ή **διαιρέτες** του πολυωνύμου $\Delta = 8x^4 + 8x^3 + 17x - 5$.

Γενικά

Ένα πολυώνυμο δ είναι διαιρέτης ή παράγοντας ενός πολυωνύμου Δ , αν η διαίρεση $\Delta : \delta$ είναι τέλεια, δηλαδή αν υπάρχει πολυώνυμο π , τέτοιο ώστε να ισχύει $\Delta = \delta \cdot \pi$.



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- 1 α) Να γίνει η διαίρεση $(4x^4 + 3x^2 - 1) : (2x - 1)$.
β) Να αναλυθεί το πολυώνυμο $4x^4 + 3x^2 - 1$ σε γινόμενο πρώτων παραγόντων.

Λύση

$$\begin{array}{r|l} 4x^4 & + 3x^2 - 1 \\ -4x^4 + 2x^3 & \\ \hline 2x^3 + 3x^2 - 1 & \\ -2x^3 + x^2 & \\ \hline 4x^2 - 1 & \\ -4x^2 + 2x & \\ \hline 2x - 1 & \\ -2x + 1 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

β) Από την ταυτότητα της Ευκλείδειας διαίρεσης, έχουμε:

$$4x^4 + 3x^2 - 1 = (2x - 1)(2x^3 + x^2 + 2x + 1).$$

Παρατηρούμε ότι το πηλίκο μπορεί να παραγοντοποιηθεί ως εξής:

$$\begin{aligned} 2x^3 + x^2 + 2x + 1 &= \\ &= x^2(2x + 1) + (2x + 1) = \\ &= (2x + 1)(x^2 + 1). \end{aligned}$$

Επομένως, το πολυώνυμο $4x^4 + 3x^2 - 1$ αναλύεται σε γινόμενο πρώτων παραγόντων ως εξής:

$$4x^4 + 3x^2 - 1 = (2x - 1)(2x + 1)(x^2 + 1).$$

- 2** Να αποδειχθεί ότι το πολυώνυμο $\delta = 3x + 2a$ είναι διαιρέτης του πολυωνύμου $\Delta = 3x^3 - 4ax^2 - a^2x + 2a^3$.

Λύση

Το πολυώνυμο δ είναι διαιρέτης του πολυωνύμου Δ , αν το υπόλοιπο της διαίρεσης $\Delta : \delta$ είναι μηδέν. Κάνουμε τη διαίρεση $\Delta : \delta$.

$$\begin{array}{r|l}
 3x^3 - 4ax^2 - a^2x + 2a^3 & 3x + 2a \\
 -3x^3 - 2ax^2 & \\
 \hline
 -6ax^2 - a^2x + 2a^3 & x^2 - 2ax + a^2 \\
 6ax^2 + 4a^2x & \\
 \hline
 +3a^2x + 2a^3 & \\
 -3a^2x - 2a^3 & \\
 \hline
 0 &
 \end{array}$$

Σύμφωνα με την ταυτότητα της Ευκλείδειας διαίρεσης έχουμε:

$$\begin{aligned}
 & 3x^3 - 4ax^2 - a^2x + 2a^3 = \\
 & = (3x + 2a)(x^2 - 2ax + a^2), \text{ που} \\
 & \text{σημαίνει ότι το πολυώνυμο } 3x + 2a \\
 & \text{είναι διαιρέτης του πολυωνύμου} \\
 & 3x^3 - 4ax^2 - a^2x + 2a^3
 \end{aligned}$$



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

- 1** Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:
- i) Το υπόλοιπο της διαίρεσης ενός πολυωνύμου με το $4x + 7$ είναι πολυώνυμο:
 - α) 1ου βαθμού β) 2ου βαθμού γ) 3ου βαθμού δ) σταθερό.
 - ii) Το υπόλοιπο της διαίρεσης ενός πολυωνύμου με το $x^2 - 4x + 9$ δεν μπορεί να είναι:
 - α) 5 β) $3x - 2$ γ) $x^2 + 3$ δ) $4x$.
 - iii) Αν ένα πολυώνυμο $P(x)$ διαιρούμενο με το $2x^2 + x + 5$ δίνει πηλίκο $x^4 + x - 2$, τότε ο βαθμός του $P(x)$ είναι:
 - α) 4 β) 6 γ) 8 δ) οποιοσδήποτε φυσικός αριθμός.

- 2** Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:


Βαθμός Διαιρετέου	Βαθμός Διαιρέτη	Βαθμός Πηλίκου
8	3	
7		2
	6	3

- 3** Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με (Σ), αν είναι σωστές ή με (Λ), αν είναι λανθασμένες:
- α) Το πηλίκο της διαίρεσης του $(2x + 1)(x + 3)$ με το $2x + 1$ είναι το $x + 3$.
 - β) Το υπόλοιπο της διαίρεσης ενός πολυωνύμου με το $x + 6$ είναι το $x^2 + 2$.
 - γ) Αν διαιρέσουμε ένα πολυώνυμο 6ου βαθμού με ένα πολυώνυμο 2ου βαθμού, τότε το πηλίκο είναι πολυώνυμο 3ου βαθμού.
 - δ) Το $x - 4$ είναι παράγοντας του $x^2 - 16$.
 - ε) Το πηλίκο της διαίρεσης $(x^3 + 1) : (x + 1)$ είναι το $x^2 - x + 1$.



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

- 1** Να κάνετε τις διαιρέσεις και να γράψετε την ταυτότητα της Ευκλείδειας διαίρεσης σε κάθε περίπτωση.
- α) $(2x^3 + x^2 - 3x + 6) : (x + 2)$ β) $(6x^3 - x^2 - 10x + 5) : (3x + 1)$
 γ) $(6x^4 - x^2 + 2x - 7) : (x - 1)$ δ) $(4x^3 + 5x - 8) : (2x - 1)$
 ε) $(x^5 - x^4 + 3x^2 + 2) : (x^2 - x + 2)$ στ) $(9x^4 - x^2 + 2x - 1) : (3x^2 - x + 1)$
 ζ) $(8x^4 - 6x^2 - 9) : (2x^2 - 3)$ η) $(3x^5 - 2x^3 - 4) : (3x^2 - 1)$
- 2** Να συμπληρώσετε τα κενά, ώστε να είναι οι διαιρέσεις σωστές.
- α)
$$\begin{array}{r|l} 6x^2 + \dots + \dots & \dots + 2 \\ -6x^2 - \dots & 2x + \dots \\ \hline 18x + \dots & \\ -18x - \dots & \\ \hline 0 & \end{array}$$
- β)
$$\begin{array}{r|l} \dots + \dots + 2x + 20 & x + \dots \\ \dots - 6x^2 & 2x^2 + \dots - \dots \\ \hline 4x^2 + \dots + 20 & \\ \dots - \dots & \\ \hline -10x + \dots & \\ \dots + \dots & \\ \hline \dots & \end{array}$$
- 3** Ποιο πολυώνυμο διαιρούμενο με το $x^2 - x + 1$ δίνει πηλίκο $2x + 3$ και υπόλοιπο $3x + 2$;
- 4** Να αποδείξετε ότι το πολυώνυμο $Q(x)$ είναι διαιρέτης του πολυώνυμου $P(x)$, όταν:
- α) $P(x) = 6x^3 - 7x^2 + 9x - 18$ και $Q(x) = 2x - 3$
 β) $P(x) = 2x^4 - x^2 + 5x - 3$ και $Q(x) = x^2 + x - 1$.
- 5** α) Να κάνετε τη διαίρεση $(x^4 - 2x^3 - 8x^2 + 18x - 9) : (x^2 - 9)$
 β) Να παραγοντοποιήσετε το πολυώνυμο $x^4 - 2x^3 - 8x^2 + 18x - 9$.
- 6** α) Να αποδείξετε ότι ο $x + 1$ είναι παράγοντας του πολυώνυμου $x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 1$.
 β) Να παραγοντοποιήσετε το πολυώνυμο $x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 1$.
- 7** Ένας μαθητής ήθελε να παραγοντοποιήσει την παράσταση $a^3 + b^3$ και θυμήθηκε ότι αναλύεται σε γινόμενο δύο παραγόντων, από τους οποίους ο ένας είναι ο $a + b$. Επειδή είχε ξεχάσει τον άλλο παράγοντα, πώς θα μπορούσε να τον βρει;
- 8** Δίνεται το πολυώνυμο $P(x) = (x^3 + 2)(x^2 - 5) + 4x^2 - 6x + 7$. Να βρείτε το πηλίκο και το υπόλοιπο της διαίρεσης
- α) $P(x) : (x^3 + 2)$ β) $P(x) : (x^2 - 5)$
- 9** Να κάνετε τη διαίρεση $(6x^3 + a) : (x - 1)$ και να βρείτε την τιμή του a , για την οποία η διαίρεση είναι τέλεια.
- 10** Αν ένας παράγοντας του πολυώνυμου $2x^3 - x^2 - 4x + 3$ είναι ο $(x - 1)^2$, να βρείτε τον άλλο παράγοντα.
- 11** Για την πλακόστρωση του δαπέδου ενός δωματίου που έχει σχήμα ορθογωνίου, χρησιμοποιήσαμε 45 πλακάκια τύπου Α, 56 πλακάκια τύπου Β και 16 πλακάκια τύπου Γ. Αν το πλάτος του δωματίου είναι $5x + 4y$, ποιο είναι το μήκος του;





✓ *Μαθαίνω να βρίσκω:*

Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο και Μέγιστο Κοινό Διαιρέτη ακεραίων αλγεβρικών παραστάσεων.



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1. Να αναλύσετε τους αριθμούς 12, 24, 300 σε γινόμενο πρώτων παραγόντων και να βρείτε το Ε.Κ.Π. και το Μ.Κ.Δ. των αριθμών αυτών.
2. Με ανάλογο τρόπο να βρείτε το Ε.Κ.Π. και το Μ.Κ.Δ. των μονωνύμων $12x^3y^2$, $24x^2y^3w$, $300x^4y$ και των πολυωνύμων $3(x - y)(x + y)$, $18(x - y)^2$, $9(x - y)$.

Σε προηγούμενη τάξη μάθαμε να βρίσκουμε το Ε.Κ.Π. και το Μ.Κ.Δ. θετικών ακεραίων αριθμών που έχουν αναλυθεί σε γινόμενο πρώτων παραγόντων.

Για παράδειγμα, οι αριθμοί 12, 24 και 300, αν αναλυθούν σε γινόμενο πρώτων παραγόντων, γράφονται:

$$12 = 2^2 \cdot 3 \quad 24 = 2^3 \cdot 3 \quad 300 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^2$$

Άρα,

Ε.Κ.Π.(12, 24, 300) = $2^3 \cdot 3 \cdot 5^2 = 600$ (Γινόμενο κοινών και μη κοινών παραγόντων με το μεγαλύτερο εκθέτη).

Μ.Κ.Δ.(12, 24, 300) = $2^2 \cdot 3 = 12$ (Γινόμενο κοινών παραγόντων με το μικρότερο εκθέτη).

Με ανάλογο τρόπο, μπορούμε να ορίσουμε το Ε.Κ.Π. και το Μ.Κ.Δ. ακεραίων αλγεβρικών παραστάσεων που έχουν αναλυθεί σε γινόμενο πρώτων παραγόντων. Δηλαδή:

Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο (Ε.Κ.Π.) δύο ή περισσότερων αλγεβρικών παραστάσεων που έχουν αναλυθεί σε γινόμενο πρώτων παραγόντων ονομάζεται, το γινόμενο των κοινών και μη κοινών παραγόντων τους με εκθέτη καθενός το μεγαλύτερο από τους εκθέτες του.

Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης (Μ.Κ.Δ.) δύο ή περισσότερων αλγεβρικών παραστάσεων που έχουν αναλυθεί σε γινόμενο πρώτων παραγόντων ονομάζεται, το γινόμενο των κοινών παραγόντων τους με εκθέτη καθενός το μικρότερο από τους εκθέτες του.

Στο εξής θα περιοριστούμε σε ακέραιες αλγεβρικές παραστάσεις με θετικούς ακέραιους συντελεστές. Στην περίπτωση αυτή, ως αριθμητικό παράγοντα του Ε.Κ.Π., θα θεωρούμε το Ε.Κ.Π. των αριθμητικών παραγόντων των παραστάσεων και ως αριθμητικό παράγοντα του Μ.Κ.Δ. θα θεωρούμε το Μ.Κ.Δ. των αριθμητικών παραγόντων των παραστάσεων.

Για παράδειγμα,

– τα μονώνυμα $12x^3y^2$, $24x^2y^3\omega$, $300x^4y$ έχουν
 $E.K.P. = 600x^4y^3\omega$ και $M.K.D. = 12x^2y$ ενώ

– τα πολυώνυμα $3(x - y)(x + y)$, $18(x - y)^2$, $9(x - y)$ έχουν
 $E.K.P. = 18(x - y)^2(x + y)$ και $M.K.D. = 3(x - y)$



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1 Να βρεθεί το Ε.Κ.Π. και ο Μ.Κ.Δ. των μονωνύμων $6x^3y\omega$, $9x^2y\omega^2$, $3xy^4$.

Λύση

Οι συντελεστές 6, 9, 3 έχουν Ε.Κ.Π. = 18 και Μ.Κ.Δ. = 3, άρα τα μονώνυμα έχουν Ε.Κ.Π. = $18x^3y^4\omega^2$ και Μ.Κ.Δ. = $3xy$.

2 Να βρεθεί το Ε.Κ.Π. και ο Μ.Κ.Δ. των πολυωνύμων:

$A = 12x^3 - 12x^2$, $B = 18x^2 - 36x + 18$ και $\Gamma = 9x^2 - 9x$.

Λύση

- Αναλύουμε τα πολυώνυμα σε γινόμενο πρώτων παραγόντων.
- Υπολογίζουμε το Ε.Κ.Π. και το Μ.Κ.Δ. των αριθμητικών παραγόντων.
- Βρίσκουμε το Ε.Κ.Π. και το Μ.Κ.Δ. των πολυωνύμων.

$A = 12x^2 - 12 = 12(x^2 - 1) = 12(x - 1)(x + 1)$
 $B = 18x^2 - 36x + 18 = 18(x^2 - 2x + 1) = 18(x - 1)^2$
 $\Gamma = 9x^2 - 9x = 9x(x - 1)$
 Οι αριθμητικοί παράγοντες 12, 18, 9 έχουν Ε.Κ.Π. = 36 και Μ.Κ.Δ. = 3.
 Τα πολυώνυμα Α, Β, Γ έχουν Ε.Κ.Π. = $36x(x - 1)^2(x + 1)$ και Μ.Κ.Δ. = $3(x - 1)$.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ



1 Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα αντιστοιχίζοντας σε κάθε ζεύγος παραστάσεων της στήλης Α, το Ε.Κ.Π. τους από τη στήλη Β.

Στήλη Α	Στήλη Β
α. $x^4(x + 2)^2$, $x(x + 2)^3$	1. $6x^2(x + 2)^2$
β. $x^3(x + 2)$, $x(x + 2)^3$	2. $x^3(x + 2)^3$
γ. $6x^2(x + 2)$, $2x(x + 2)^2$	3. $6x^2(x + 2)$
	4. $x^4(x + 2)^3$

α	β	γ

- 2 Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα, γράφοντας σε κάθε κενό το Ε.Κ.Π. των παραστάσεων Α, Β.

B \ A	$4x^3$	$2x(x-1)$	$9(x-1)^2$
$6x^2$			
$x^2(x-1)$			
$8x^5$			

- 3 Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα αντιστοιχίζοντας σε κάθε ζεύγος παραστάσεων της στήλης Α, το Μ.Κ.Δ. τους από τη στήλη Β.

Στήλη Α		Στήλη Β
α. $6x^3(x+1)^2$,	$3x(x+1)^3$	1. $6x^2(x+1)^2$
β. $2x^2(x+1)^3$,	$3x^4(x+1)^2$	2. $3x(x+1)^2$
γ. $3x^2(x+1)$,	$6x^3(x+1)^2$	3. $3x^2(x+1)$
		4. $x^2(x+1)^2$

α	β	γ

- 4 Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα γράφοντας σε κάθε κενό το Μ.Κ.Δ. των παραστάσεων Α, Β.

B \ A	$3x^2$	$x^4(x-2)^2$	$6(x-2)^3$
$6x(x-2)^2$			
$2x^3(x-2)$			
$3x^3(x-2)^3$			



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

- 1 Να βρείτε το Ε.Κ.Π. και το Μ.Κ.Δ. των παραστάσεων:
- α) $12x^3y^2\omega^2$, $18x^2y\omega^3$, $24x^2y^3\omega^4$
 β) $15ax^3y$, $10ax^2\omega^2$, $5y\omega^2$
 γ) $2x^2(x+y)^2$, $3xy^3(x+y)^2$, $8x^2y(x-y)(x+y)$
- 2 Να βρείτε το Ε.Κ.Π. και το Μ.Κ.Δ. των παραστάσεων:
- α) $6(x^2-y^2)$, $4(x-y)^2$, $12(x-y)^3$
 β) a^2-3a+2 , a^2-4 , a^3-4a
 γ) a^3-a^2 , $(a^2-a)(a^2-1)$, a^3-2a^2+a

1.9 Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις



- ✓ Γνωρίζω ποια αλγεβρική παράσταση λέγεται ρητή και πότε ορίζεται.
- ✓ Μαθαίνω να απλοποιώ ρητές αλγεβρικές παραστάσεις.



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1. Ποια είναι η τιμή της παράστασης $\frac{x^3 + 4}{x - 1}$ για $x = 0$;
Μπορείτε να βρείτε την τιμή της παράστασης για $x = 1$;

2. Ποιο από τα παρακάτω κλάσματα απλοποιείται;

$$\frac{6 \cdot 2 + 7}{3 \cdot 2}, \quad \frac{6 \cdot 2 \cdot 7}{3 + 2}, \quad \frac{6 \cdot 2 \cdot 7}{3 \cdot 2}$$

3. Ποια από τις παρακάτω παραστάσεις απλοποιείται;

$$\frac{6x + y}{3x}, \quad \frac{6xy}{3 + x}, \quad \frac{6xy}{3x}$$

Μια αλγεβρική παράσταση (π.χ. $\frac{x^3 + 4}{x - 1}$, $\frac{xy\omega}{x + y}$, $\frac{2}{x^2 + 4}$) που είναι κλάσμα και οι όροι του είναι πολυώνυμα, λέγεται **ρητή αλγεβρική παράσταση** ή απλώς **ρητή παράσταση**.

Οι μεταβλητές μιας ρητής παράστασης δεν μπορούν να πάρουν τιμές που μηδενίζουν τον παρονομαστή της, αφού δεν ορίζεται κλάσμα με παρονομαστή μηδέν.

Για παράδειγμα, η παράσταση $\frac{x^3 + 4}{x - 1}$ ορίζεται, αν $x \neq 1$.

Στη συνέχεια, όταν γράφουμε μια ρητή παράσταση, θα εννοείται ότι οι μεταβλητές της δεν παίρνουν τιμές που μηδενίζουν τον παρονομαστή.

Όπως μια αριθμητική παράσταση, έτσι και μια ρητή παράσταση, μπορεί να απλοποιηθεί, αν ο αριθμητής και ο παρονομαστής της είναι γινόμενα και έχουν κοινό παράγοντα.

Έτσι, η παράσταση $\frac{6x + y}{3x}$ δεν απλοποιείται, ενώ η παράσταση $\frac{6xy}{3x}$ απλοποιείται, γιατί

οι όροι της είναι γινόμενα και έχουν κοινό παράγοντα το $3x$. Αν διαιρέσουμε και τους δύο όρους με τον κοινό παράγοντα, έχουμε $\frac{6xy}{3x} = \frac{6xy : 3x}{3x : 3x} = \frac{2y}{1} = 2y$

Η προηγούμενη απλοποίηση γίνεται συντομότερα, αν διαγράψουμε τον κοινό παράγοντα,

οπότε έχουμε $\frac{6xy}{3x} = \frac{3x \cdot 2y}{3x} = 2y$

Αν όμως σε μια ρητή παράσταση ο αριθμητής ή ο παρονομαστής δεν είναι γινόμενο, τότε για να την απλοποιήσουμε εργαζόμαστε ως εξής:

- Παραγοντοποιούμε και τους δύο όρους της και
- διαγράφουμε τους κοινούς παράγοντες των όρων της.

Για παράδειγμα, η παράσταση $\frac{5x-10}{x^2-4}$ απλοποιείται ως εξής:

$$\frac{5x-10}{x^2-4} = \frac{5(x-2)}{x^2-2^2} = \frac{5\cancel{(x-2)}}{\cancel{(x-2)}(x+2)} = \frac{5}{x+2}$$



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1 Για ποιες τιμές των μεταβλητών τους ορίζονται οι παραστάσεις;

α) $\frac{x^2 + 7x + 2}{x}$

β) $\frac{x^2 + 6}{x + 2}$

γ) $\frac{x^2 + y^2}{x - y}$

Λύση

α) Η παράσταση $\frac{x^2 + 7x + 2}{x}$ ορίζεται, αν η μεταβλητή x παίρνει τιμές που δε μηδενίζουν τον παρονομαστή, δηλαδή για $x \neq 0$.

β) Ομοίως η παράσταση $\frac{x^2 + 6}{x + 2}$ ορίζεται, αν $x + 2 \neq 0$, δηλαδή για $x \neq -2$.

γ) Η παράσταση $\frac{x^2 + y^2}{x - y}$ ορίζεται, αν οι μεταβλητές x, y παίρνουν τιμές, τέτοιες ώστε $x - y \neq 0$, δηλαδή για $x \neq y$.

2 Να απλοποιηθούν οι παραστάσεις:

α) $\frac{12x^3y\omega^2}{8xy^3}$

β) $\frac{3x^2 - 3}{6x^2 - 6x}$

γ) $\frac{x^2 - 2xy + y^2}{x^3 - y^3}$

Λύση

α) Στην παράσταση $\frac{12x^3y\omega^2}{8xy^3}$ και οι δύο όροι της είναι γινόμενα, οπότε έχουμε

$$\frac{12x^3y\omega^2}{8xy^3} = \frac{3x^2\omega^2}{2y^2}$$

β) Παραγοντοποιούμε και τους δύο όρους της παράστασης και έχουμε

$$\frac{3x^2 - 3}{6x^2 - 6x} = \frac{3(x^2 - 1)}{6x(x - 1)} = \frac{3\cancel{(x-1)}(x+1)}{6x\cancel{(x-1)}} = \frac{x+1}{2x}$$

γ) Ομοίως έχουμε $\frac{x^2 - 2xy + y^2}{x^3 - y^3} = \frac{(x-y)^2}{\cancel{(x-y)}(x^2 + xy + y^2)} = \frac{x-y}{x^2 + xy + y^2}$



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

- 1 Να συμπληρώσετε τον πίνακα αντιστοιχίζοντας σε κάθε παράσταση της στήλης Α τις τιμές της μεταβλητής της από τη στήλη Β, για τις οποίες ορίζεται.

Στήλη Α	Στήλη Β
α. $\frac{1}{x}$	1. $x \neq 1$
β. $\frac{x-1}{x+1}$	2. $x \neq 0$ και $x \neq 1$
γ. $\frac{x}{x^2-1}$	3. $x \neq -1$
δ. $\frac{2(x-1)}{x-1}$	4. $x \neq 1$ και $x \neq -1$
ε. $\frac{3}{x^2+1}$	5. οποιοσδήποτε αριθμός
	6. $x \neq 0$

α	β	γ	δ	ε

- 2 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω ισότητες με (Σ), αν είναι σωστές ή με (Λ), αν είναι λανθασμένες.

α) $\frac{x^2+1}{x} = x+1$ β) $\frac{x(x+1)}{x} = x+1$

γ) $\frac{(x+2)(x+1)}{4(x+1)} = \frac{x+2}{4}$ δ) $\frac{x+2(x+1)}{4(x+1)} = \frac{x+2}{4}$

ε) $\frac{x^2-y^2}{x-y} = x+y$ στ) $\frac{(x-y)^2}{x-y} = x+y$

- 3 Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω ισότητες:

α) $\frac{7x}{x(\dots)} = \frac{7}{x-2}$ β) $\frac{(a+\beta)(\dots)}{(a-\beta)(\dots)} = 1$ γ) $\frac{x(x+1)}{\dots} = x$

δ) $\frac{x(x+1)}{\dots} = x+1$ ε) $\frac{\dots}{2(a+\beta)^2} = \frac{1}{a+\beta}$ στ) $\frac{3(x+2)}{\dots} = \frac{3}{x+2}$

- 4 Ένας μαθητής για να βρει τις τιμές της μεταβλητής x , για τις οποίες ορίζεται η παράσταση $\frac{x}{x(x-4)}$, έγραψε $\frac{x}{x(x-4)} = \frac{1}{x-4}$ και απάντησε ότι η παράσταση ορίζεται όταν $x \neq 4$. Είναι σωστή η απάντησή του;



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

1 Να βρείτε τις τιμές των μεταβλητών για τις οποίες ορίζονται οι παραστάσεις:

α) $\frac{1}{x-4}$

β) $\frac{y+3}{2y-5}$

γ) $\frac{\omega-2}{(\omega+1)^2}$

δ) $\frac{6x+1}{x(x-3)}$

2 Να απλοποιήσετε τις παραστάσεις:

α) $\frac{4x}{6x}$

β) $\frac{3y^2}{12y}$

γ) $\frac{2x\omega^2}{8x^2\omega}$

δ) $\frac{5a^2\beta\gamma^3}{10a\beta^2\gamma}$

ε) $\frac{x+4}{4+x}$

στ) $\frac{y-1}{1-y}$

ζ) $\frac{\omega-2}{(2-\omega)^2}$

η) $\frac{(a-\beta)(\beta-\gamma)}{(\beta-a)(\gamma-\beta)}$

3 Να απλοποιήσετε τις παραστάσεις:

α) $\frac{6x}{2x^2+4x}$

β) $\frac{3y-9}{y^2-3y}$

γ) $\frac{x^2+x\omega}{\omega^2+x\omega}$

δ) $\frac{5a^2-20}{(a-2)^2}$

ε) $\frac{x^2-16}{x^2-4x}$

στ) $\frac{y^2-1}{y^2+2y+1}$

ζ) $\frac{6x^2+3x\omega}{4x^2-\omega^2}$

η) $\frac{a^2+a\beta+\beta^2}{a^3-\beta^3}$

4 Να απλοποιήσετε τις παραστάσεις:

α) $\frac{x^2+3x+2}{x^2+4x+4}$

β) $\frac{y^2-5y+4}{y^2-6y+8}$

γ) $\frac{\omega^3-2\omega^2+\omega}{\omega^3-\omega}$

5 Να απλοποιήσετε τις παραστάσεις:

α) $\frac{x(x-1)+4(x-1)}{x^2+2x-3}$

β) $\frac{y(y-3)+y^2-9}{4y^2-9}$

γ) $\frac{(2\omega+1)^2-(\omega+2)^2}{\omega^4-1}$

δ) $\frac{(a+1)(a-2)^2-4(a+1)}{a^3+a^2}$

6 Ένας λαμπαδηδρόμος κατά τα τελευταία μέτρα της διαδρομής του διήνυσε την απόσταση AB με σταθερή ταχύτητα 5 m/sec. Φτάνοντας στο σημείο B ένας άλλος λαμπαδηδρόμος ξεκινώντας από το σημείο B διήνυσε την απόσταση BΓ με σταθερή επιτάχυνση 4 m/sec². Αν ο χρόνος που κινήθηκε κάθε αθλητής ήταν t sec να αποδείξετε ότι η μέση ταχύτητα με την οποία διανύθηκε η απόσταση ΑΓ ήταν $t + \frac{5}{2}$ m/sec



1.10

Πράξεις ρητών παραστάσεων



✓ Μαθαίνω να πολλαπλασιάζω και να διαιρώ ρητές παραστάσεις.

✓ Μαθαίνω να προσθέτω και να αφαιρώ ρητές παραστάσεις.



A Πολλαπλασιασμός – Διαίρεση ρητών παραστάσεων

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1. Να κάνετε τις πράξεις: $4 \cdot \frac{3}{5}$, $\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4}$, $\frac{2}{5} : \frac{4}{7}$

2. Με ανάλογο τρόπο να κάνετε και τις παρακάτω πράξεις:

$$2x \cdot \frac{3xy}{5\omega}, \quad \frac{3x^2}{2\alpha\beta} \cdot \frac{2\alpha^2\beta}{9xy}, \quad \frac{9x}{y+1} : \frac{3x^2}{5y+5}$$

Πολλαπλασιασμός

Για να πολλαπλασιάσουμε έναν ακέραιο αριθμό με ένα κλάσμα ή για να πολλαπλασιάσουμε δύο κλάσματα, χρησιμοποιούμε τους εξής κανόνες.

$$a \cdot \frac{\beta}{\gamma} = \frac{a\beta}{\gamma}$$

και

$$\frac{a}{\beta} \cdot \frac{\gamma}{\delta} = \frac{a\gamma}{\beta\delta}$$

Με τον ίδιο τρόπο πολλαπλασιάζουμε και μια ακέραια με μια ρητή παράσταση ή δύο ρητές παραστάσεις.

Για παράδειγμα, $3x \cdot \frac{5x^2}{2y} = \frac{3x \cdot 5x^2}{2y} = \frac{15x^3}{2y}$ και

$$\frac{x^2-1}{3x+3} \cdot \frac{2x}{x-1} = \frac{(x^2-1) \cdot 2x}{(3x+3)(x-1)} = \frac{2x \cancel{(x-1)} \cancel{(x+1)}}{3 \cancel{(x+1)} \cancel{(x-1)}} = \frac{2x}{3}$$

Όπως βλέπουμε στο προηγούμενο παράδειγμα, μετά τις πράξεις εκτελούμε και τις δυνατές απλοποιήσεις.

Διαίρεση

Για να διαιρέσουμε δύο κλάσματα χρησιμοποιούμε τον παρακάτω κανόνα

$$\frac{a}{\beta} : \frac{\gamma}{\delta} = \frac{a}{\beta} \cdot \frac{\delta}{\gamma} = \frac{a\delta}{\beta\gamma}$$

Με τον ίδιο τρόπο διαιρούμε και δύο ρητές παραστάσεις. Για παράδειγμα,

$$\frac{x}{x+1} : \frac{2x^2}{x^2-1} = \frac{x}{x+1} \cdot \frac{x^2-1}{2x^2} = \frac{x(x^2-1)}{(x+1) \cdot 2x^2} = \frac{\cancel{x} \cancel{(x-1)} \cancel{(x+1)}}{2x^2 \cancel{(x+1)}} = \frac{x-1}{2x}$$

Σύνθετα κλάσματα

Το σύνθετο κλάσμα $\frac{\frac{a}{\beta}}{\frac{\gamma}{\delta}}$, ως γνωστόν, εκφράζει το πηλίκο $\frac{a}{\beta} : \frac{\gamma}{\delta}$ που είναι ίσο με

$\frac{a}{\beta} \cdot \frac{\delta}{\gamma}$ και επομένως ισχύει

$$\frac{\frac{a}{\beta}}{\frac{\gamma}{\delta}} = \frac{a\delta}{\beta\gamma}$$

Μνημονικός κανόνας

$$\frac{\frac{a}{\beta}}{\frac{\gamma}{\delta}} = \frac{a\delta}{\beta\gamma}$$

Τον ίδιο κανόνα χρησιμοποιούμε και στις ρητές παραστάσεις.

Για παράδειγμα, $\frac{\frac{2a^2}{x}}{\frac{4a}{x^2}} = \frac{2a^2x^2}{4ax} = \frac{ax}{2}$



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1 Να βρεθούν τα γινόμενα: α) $(5x^2 + 5x) \cdot \frac{3x}{2x + 2}$ β) $\frac{x^2 - 2x + 1}{3x + 6} \cdot \frac{x^2 + 2x}{x - 1}$

Λύση

$$\alpha) (5x^2 + 5x) \cdot \frac{3x}{2x + 2} = \frac{(5x^2 + 5x)3x}{2x + 2} = \frac{5x(x+1)3x}{2(x+1)} = \frac{15x^2}{2}$$

$$\beta) \frac{x^2 - 2x + 1}{3x + 6} \cdot \frac{x^2 + 2x}{x - 1} = \frac{(x^2 - 2x + 1)(x^2 + 2x)}{(3x + 6)(x - 1)} = \frac{(x-1)^2x(x+2)}{3(x+2)(x-1)} = \frac{(x-1)x}{3} = \frac{x^2 - x}{3}$$

2 Να γίνουν οι πράξεις:

$$\alpha) \frac{x^2 - a^2}{x} : \frac{x^3 - a^3}{x^2} \quad \beta) \frac{a^2 - x^2}{2a + 2x} \div \frac{a^2}{a}$$

Λύση

$$\alpha) \frac{x^2 - a^2}{x} : \frac{x^3 - a^3}{x^2} = \frac{x^2 - a^2}{x} \cdot \frac{x^2}{x^3 - a^3} = \frac{(x^2 - a^2)x^2}{x(x^3 - a^3)} = \frac{(x-a)(x+a)x^2}{x(x-a)(x^2 + xa + a^2)} = \frac{(x+a)x}{x^2 + ax + a^2} = \frac{x^2 + ax}{x^2 + ax + a^2}$$

$$\beta) \frac{a^2 - x^2}{2a + 2x} \div \frac{a^2}{a} = \frac{a(a^2 - x^2)}{a^2(2a + 2x)} = \frac{a(a-x)(a+x)}{2a^2(a+x)} = \frac{a-x}{2a}$$



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

1 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω ισότητες με (Σ), αν είναι σωστές ή με (Λ), αν είναι λανθασμένες.

α) $x \cdot \frac{1}{y} = \frac{x}{xy}$ β) $x \cdot \frac{1}{y} = \frac{x}{y}$

γ) $3x : \frac{2}{x} = \frac{3}{2}$ δ) $3x : \frac{2}{x} = \frac{3x^2}{2}$

ε) $\frac{x-1}{y} \cdot \frac{5}{x-1} = \frac{5}{y}$ στ) $\frac{a}{x} \cdot \frac{x-2}{x} = \frac{ax-2}{x^2}$

ζ) $\frac{a}{a^2+1} \cdot \frac{a^2+1}{a} = 0$ η) $\frac{a}{\beta+2} : \frac{a}{\beta+2} = 1$

2 Να συμπληρώσετε τις ισότητες:

α) $3x \cdot \frac{\dots\dots\dots}{y} = \frac{6x^2}{y}$ β) $\frac{x}{y} \cdot \frac{1}{\dots\dots\dots} = \frac{1}{y^2}$ γ) $\frac{4x}{y} : \frac{\dots\dots\dots}{\omega} = \frac{\omega}{y}$

δ) $\frac{x+2}{x-1} \cdot \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} = 1$ ε) $\frac{x+2}{x-1} : \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} = 1$ στ) $\frac{x}{y} : \frac{x+2}{\dots\dots\dots} = \frac{x}{x+2}$

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ



1 Να υπολογίσετε τα γινόμενα:

α) $\frac{1}{x^2} \cdot \frac{x}{y}$ β) $\frac{9x}{4y} \cdot \frac{1}{3x}$ γ) $12x^2 \cdot \frac{1}{9x}$

δ) $\frac{2a^3}{3\beta^2} \cdot \frac{6\beta}{4a^2}$ ε) $(-5\omega^2) \cdot \frac{3}{10\omega}$ στ) $(-\frac{3a\beta}{2\beta}) \cdot (-\frac{4}{a^2})$

2 Να κάνετε τις διαιρέσεις:

α) $8x : \frac{6}{x}$ β) $\frac{1}{y^2} : (-\frac{3}{y})$ γ) $(-\frac{a^2}{\beta^3}) : 3a^2$ δ) $(-\frac{x^3}{2\omega}) : (-\frac{x^2}{4\omega^2})$

3 Να υπολογίσετε τα γινόμενα:

α) $\frac{2x+6}{x^2} \cdot \frac{4x}{x+3}$ β) $\frac{y-5}{y+2} \cdot \frac{2+y}{5-y}$ γ) $\frac{x-\omega}{x^2\omega^3} \cdot \frac{x^3\omega^2}{x^2-\omega^2}$

δ) $\frac{a^2-4}{a^2+a-6} \cdot \frac{a+3}{a^2+2a}$ ε) $\frac{x^2+x}{x^2-4} \cdot \frac{x^2+5x+6}{x^2+3x}$ στ) $\frac{4y^2-9}{4y^2-12y+9} \cdot \frac{y^2+3y}{2y^2+3y}$

4 Να κάνετε τις διαιρέσεις:

α) $\frac{x+4}{5} : \frac{x+4}{15}$ β) $\frac{2y-1}{y+1} : \frac{1-2y}{1+y}$ γ) $(-\frac{\omega+2}{\omega}) : (\omega+2)$

δ) $\frac{a+1}{\beta^2} : \frac{(a+1)^2}{\beta}$ ε) $\frac{x+y}{x^2-xy} : \frac{x^2+xy}{x-y}$ στ) $\frac{x^2-4}{x^3+8} : \frac{x-2}{x^2-2x+4}$

5 Να υπολογίσετε τις παραστάσεις:

α) $(\frac{x-2}{x+1} \cdot \frac{4x+4}{x+2}) : \frac{8x-8}{x+2}$ β) $\frac{x+2}{x-1} : (\frac{2x+6}{x-1} \cdot \frac{x+2}{x+3})$ γ) $(\frac{x+2}{x-1} : \frac{2x+6}{x-1}) \cdot \frac{x+2}{x+3}$

B Πρόσθεση – Αφαίρεση ρητών παραστάσεων

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1. Να κάνετε τις πράξεις: $\frac{7}{9} + \frac{19}{9} - \frac{11}{9}$, $\frac{3}{2} + \frac{1}{6} - \frac{1}{3}$.

2. Με ανάλογο τρόπο να κάνετε και τις παρακάτω πράξεις:

$$\frac{3x}{x-2} + \frac{2x-1}{x-2} - \frac{7+x}{x-2}, \quad \frac{3}{2a} + \frac{1}{6a\beta} - \frac{1}{3\beta}$$

Για να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε ομώνυμα κλάσματα, χρησιμοποιούμε τους εξής κανόνες

$$\frac{a}{\beta} + \frac{\gamma}{\beta} = \frac{a+\gamma}{\beta} \quad \text{και} \quad \frac{a}{\beta} - \frac{\gamma}{\beta} = \frac{a-\gamma}{\beta}$$

Με τον ίδιο τρόπο προσθέτουμε ή αφαιρούμε και ρητές παραστάσεις που έχουν τον ίδιο παρονομαστή. Για παράδειγμα,

$$\begin{aligned} \frac{3x}{x-2} + \frac{2x-1}{x-2} - \frac{7+x}{x-2} &= \frac{3x + (2x-1) - (7+x)}{x-2} = \\ &= \frac{3x + 2x - 1 - 7 - x}{x-2} = \frac{4x - 8}{x-2} = \frac{4(x-2)}{x-2} = 4 \end{aligned}$$

Αν όμως οι ρητές παραστάσεις δεν έχουν τον ίδιο παρονομαστή, τότε βρίσκουμε το Ε.Κ.Π. των παρονομαστών και τις μετατρέπουμε σε ρητές παραστάσεις με τον ίδιο παρονομαστή, όπως και στα αριθμητικά κλάσματα.

Για παράδειγμα, αν θέλουμε να υπολογίσουμε το άθροισμα $\frac{2}{3x^2-3x} + \frac{5}{6x} - \frac{2}{3x-3}$ εργαζόμαστε ως εξής:

- Παραγοντοποιούμε τους παρονομαστές.

$$3x^2 - 3x = 3x(x-1) \quad \text{και} \quad 3x - 3 = 3(x-1)$$

- Βρίσκουμε το Ε.Κ.Π. των παρονομαστών.

$$\text{Ε.Κ.Π.} = 6x(x-1)$$

- Μετατρέπουμε τα κλάσματα σε ομώνυμα.

$$\frac{2}{3x^2-3x} + \frac{5}{6x} - \frac{2}{3x-3} = \frac{\overset{2}{2}}{3x(x-1)} + \frac{\overset{x-1}{5}}{6x} - \frac{\overset{2x}{2}}{3(x-1)} =$$

- Εκτελούμε τις πράξεις και τις δυνατές απλοποιήσεις.

$$= \frac{4 + 5(x-1) - 4x}{6x(x-1)} = \frac{4 + 5x - 5 - 4x}{6x(x-1)} = \frac{\cancel{x-1}}{6x(\cancel{x-1})} = \frac{1}{6x}$$



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1 Να γίνουν οι πράξεις: α) $\frac{9x+6}{x^2-1} - \frac{15}{2x-2}$ β) $\frac{4}{x^2-a^2} - \frac{2}{x^2-ax} - \frac{1}{x^2+ax}$

Λύση

α) Παραγοντοποιούμε τους παρονομαστές, οπότε έχουμε:

$$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1) \text{ και } 2x - 2 = 2(x - 1)$$

Το Ε.Κ.Π. των παρονομαστών είναι $2(x - 1)(x + 1)$. Άρα

$$\begin{aligned} \frac{9x+6}{x^2-1} - \frac{15}{2x-2} &= \frac{\overbrace{9x+6}^2}{(x-1)(x+1)} - \frac{\overbrace{15}^{x+1}}{2(x-1)} = \frac{2(9x+6) - 15(x+1)}{2(x-1)(x+1)} = \\ &= \frac{18x + 12 - 15x - 15}{2(x-1)(x+1)} = \frac{3x - 3}{2(x-1)(x+1)} = \frac{3\cancel{(x-1)}}{2\cancel{(x-1)}(x+1)} = \frac{3}{2(x+1)} \end{aligned}$$


β) Παραγοντοποιούμε τους παρονομαστές, οπότε έχουμε:

$$x^2 - a^2 = (x - a)(x + a), \quad x^2 - ax = x(x - a), \quad x^2 + ax = x(x + a)$$

Το Ε.Κ.Π. των παρονομαστών είναι $x(x - a)(x + a)$. Άρα

$$\begin{aligned} \frac{4}{x^2-a^2} - \frac{2}{x^2-ax} - \frac{1}{x^2+ax} &= \frac{\overbrace{4}^x}{(x-a)(x+a)} - \frac{\overbrace{2}^{x+a}}{x(x-a)} - \frac{\overbrace{1}^{x-a}}{x(x+a)} = \\ &= \frac{4x - 2(x+a) - (x-a)}{x(x-a)(x+a)} = \frac{4x - 2x - 2a - x + a}{x(x-a)(x+a)} = \frac{\cancel{x-a}}{x\cancel{(x-a)}(x+a)} = \frac{1}{x(x+a)} \end{aligned}$$

2 Πούλησε κάποιος τα οικοπέδα Α και Β και από το καθένα εισέπραξε 50.000 ευρώ. Αν με τα χρήματα αυτά αγόρασε το διαμέρισμα Γ, να αποδειχθεί ότι κάθε m^2 του διαμερίσματος στοιχίζει όσο ένα m^2 του οικοπέδου Α και ένα m^2 του οικοπέδου Β. (Οι διαστάσεις δίνονται σε m).



Λύση

Από κάθε οικόπεδο εισέπραξε 50000 ευρώ, οπότε για την αγορά του διαμερίσματος έδωσε 100000 ευρώ. Το εμβαδόν του οικοπέδου Α είναι $x(x - 1) m^2$, του οικοπέδου Β είναι $x(x + 1) m^2$ και του διαμερίσματος Γ είναι $(x^2 - 1) m^2$. Κάθε m^2 του οικοπέδου Α στοιχίζει $\frac{50000}{x(x-1)}$ ευρώ, του οικοπέδου Β στοιχίζει $\frac{50000}{x(x+1)}$

ευρώ και του διαμερίσματος Γ στοιχίζει $\frac{100000}{x^2-1}$ ευρώ. Άρα έχουμε:

$$\frac{\overbrace{50000}^{x+1}}{x(x-1)} + \frac{\overbrace{50000}^{x-1}}{x(x+1)} = \frac{50000(x+1) + 50000(x-1)}{x(x-1)(x+1)} = \frac{100000x}{x(x-1)(x+1)} = \frac{100000}{x^2-1}$$

Δηλαδή, κάθε m^2 του διαμερίσματος Γ στοιχίζει όσο ένα m^2 του οικοπέδου Α και ένα m^2 του οικοπέδου Β.



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

1 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω ισότητες με (Σ), αν είναι σωστές ή με (Λ), αν είναι λανθασμένες.

α) $\frac{x}{x+1} + \frac{1}{x+1} = 1$ β) $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{2}{x+y}$

γ) $\frac{a+4}{a} - \frac{4}{a} = 1$ δ) $\frac{a+\beta}{a-\beta} + \frac{a+\beta}{\beta-a} = 0$

ε) $1 + \frac{x}{\omega} = \frac{1+x}{\omega}$ στ) $\frac{a}{x} - \frac{a+2}{x} = \frac{2}{x}$

2 Ένας μαθητής έγραψε τις παρακάτω ισότητες και ο καθηγητής του είπε ότι σε κάποιο σημείο έκανε ένα λάθος. Μπορείτε να εντοπίσετε το λάθος αυτό;

α) $\frac{a}{a-\beta} + \frac{\beta}{\beta-a} = \frac{a}{a-\beta} - \frac{\beta}{a-\beta} = \frac{a-\beta}{a-\beta} = 1$

β) $\frac{3x+2}{x+1} - \frac{2x-1}{x+1} = \frac{3x+2-2x-1}{x+1} = \frac{x+1}{x+1} = 1$

3 Να συμπληρώσετε τις ισότητες:

α) $\frac{x}{x+6} - \dots = 0$ β) $\frac{x}{x+6} + \dots = 1$ γ) $\dots + \frac{x}{x+1} = \frac{2x}{x+1}$

δ) $\dots - \frac{5}{x+2} = \frac{1}{x+2}$ ε) $\frac{2x-1}{x} + \dots = 2$ στ) $\frac{3x+8}{x} - \dots = 3$



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

1 Να υπολογίσετε τις παραστάσεις:

α) $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ β) $\frac{3}{x+1} - \frac{2}{x}$ γ) $\frac{1}{y^2} - \frac{1}{y}$ δ) $\frac{1}{\omega^2} - \frac{2}{\omega^2+1}$

2 Να υπολογίσετε τις παραστάσεις:

α) $\frac{2x}{2x-6} - \frac{3}{x-3}$ β) $\frac{y-6}{y^2+2y} - \frac{4}{y+2}$ γ) $\frac{3\omega+6}{\omega^2-4} - \frac{4}{2\omega-4}$

δ) $\frac{1}{2x+12} + \frac{x}{36-x^2}$ ε) $\frac{9x}{x^2-x\omega} + \frac{3\omega}{\omega^2-x\omega}$ στ) $\frac{a+7}{a^2+4a+3} - \frac{3}{a+1}$

3 Να απλοποιήσετε τα κλάσματα:

α) $\frac{x - \frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x}}$ β) $\frac{y-2 + \frac{1}{y}}{y - \frac{1}{y}}$ γ) $\frac{\omega+1 + \frac{1}{\omega}}{1 - \frac{1}{\omega^3}}$ δ) $\frac{\frac{1}{a} - \frac{1}{\beta}}{\frac{\beta}{a} - \frac{a}{\beta}}$

4 Να υπολογίσετε τις παραστάσεις:

$$\alpha) \frac{x-2}{x} + \frac{4}{x-2} - \frac{8}{x^2-2x}$$

$$\beta) \frac{3}{x+2y} - \frac{2}{x-2y} + \frac{2x+16y}{x^2-4y^2}$$

$$\gamma) \frac{y^2-6}{y^2-5y+6} - \frac{2}{y-2} + \frac{3}{y-3}$$

$$\delta) \frac{x^2}{x-y} + \frac{y^2}{x+y} - \frac{2xy^2}{x^2-y^2}$$

5 Να υπολογίσετε τις παραστάσεις:

$$\alpha) \left(\frac{x+3}{2x+1} - \frac{x}{2x-1} \right) \left(1 + \frac{1}{4x-3} \right)$$

$$\beta) \left[\frac{x+3}{x^2-1} + \frac{x-3}{(x-1)^2} \right] : \frac{x^2-3}{(x-1)^2}$$

$$\gamma) \left(1 - \frac{2\alpha\beta}{\alpha^2 + \beta^2} \right) \left(\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\alpha + \beta}{\alpha - \beta} \right)$$

$$\delta) \left(\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha} - 1 \right) : \left(\frac{\alpha^2}{\beta} + \frac{\beta^2}{\alpha} \right)$$


6 α) Να αποδείξετε ότι $\frac{x^3-y^3}{x-y} + xy = (x+y)^2$.

β) Να υπολογίσετε την παράσταση $\frac{56^3 - 44^3}{12} + 56 \cdot 44$.

7 α) Αν $A = \frac{2x}{x^2+1}$ και $B = \frac{x^2-1}{x^2+1}$, να αποδείξετε ότι $A^2 + B^2 = 1$.

β) Να αποδείξετε ότι οι αριθμοί 1 , $\frac{200}{10001}$, $\frac{9999}{10001}$ αποτελούν μήκη πλευρών ορθογωνίου τριγώνου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ



1 Να βρείτε την τιμή της παράστασης

$$K = \alpha^3 - (1 + \alpha)^{-2} + 4 \left(\frac{\beta}{\alpha} + \frac{1}{2} \right)^{-1} + \left[\left(\frac{\beta}{\alpha} - 2004 \right)^{2004} \right]^0, \text{ αν είναι } \alpha = -\frac{3}{2} \text{ και } \beta = 3.$$

(Διαγωνισμός «Θαλής» Ε.Μ.Ε. 2002).

2 Για κάθε θετικό ακέραιο n , να αποδείξετε ότι:

$$\alpha) (\alpha - \beta + 3\gamma)^{2n+1} + (\beta - \alpha - 3\gamma)^{2n+1} = 0 \quad \beta) (x - y - \omega)^{2n} - (y + \omega - x)^{2n} = 0$$

3 Αν ισχύει $\frac{x}{y} = -\frac{1}{2}$, να βρείτε την αριθμητική τιμή των παραστάσεων:

$$A = \frac{4x^2 - 6xy + y^2}{x^2 + y^2}$$

$$B = \frac{2x^3 - 2xy^2 + 3y^3}{x^2y + y^3}$$

4 Δίνεται το πολυώνυμο $P(x) = -2x^2 + 2x + 800$.

α) Να αποδείξετε ότι $P(1-x) = P(x)$.

β) Να βρείτε την αριθμητική τιμή $P(100)$ και $P(-99)$.

- 5** α) Να αποδείξετε ότι $a^3 + b^3 + \gamma^3 - 3ab\gamma = (a + b + \gamma)(a^2 + b^2 + \gamma^2 - a\beta - \beta\gamma - \gamma\alpha)$.
(Ταυτότητα Euler).
β) Αν $a + b + \gamma = 0$, να αποδείξετε ότι $a^3 + b^3 + \gamma^3 = 3ab\gamma$.
γ) Να παραγοντοποιήσετε την παράσταση $(x - y)^3 + (y - \omega)^3 + (\omega - x)^3$.
- 6** Αν $a + b = -\frac{1}{3}$ και $ab = -\frac{7}{3}$, τότε να αποδείξετε ότι:
α) $a^2 + b^2 = \frac{43}{9}$ β) $(3a + 1)^2 + (3b + 1)^2 + 9(a + b) = 40$
- 7** Αν για τους αριθμούς x, y ισχύει μια από τις παρακάτω ισότητες να αποδείξετε ότι οι αριθμοί x, y είναι ίσοι ή αντίθετοι.
α) $x^4 - 2y^2 = x^2(y^2 - 2)$ β) $x^3 + y^3 = x^2y + xy^2$
- 8** α) Να παραγοντοποιήσετε τα τριώνυμα $x^2 + 4x + 3$, $x^2 + 2x - 3$.
β) Να υπολογίσετε την παράσταση $A = \frac{1}{x^2 + 4x + 3} + \frac{1}{x^2 - 1} + \frac{1}{x^2 + 2x - 3}$
- 9** Δίνονται οι παραστάσεις $A = x(x + 3)$ και $B = (x + 1)(x + 2)$.
α) Να αποδείξετε ότι $B = A + 2$ και $AB + 1 = (A + 1)^2$.
β) Να παραγοντοποιήσετε την παράσταση $x(x + 1)(x + 2)(x + 3) + 1$.
- 10** α) Το εμβαδόν ενός κύκλου είναι $16\pi x^4 + 8\pi x^2 + \pi$. Να βρείτε την ακτίνα του.
β) Να βρείτε την ακτίνα ενός κύκλου που έχει εμβαδόν ίσο με το άθροισμα των εμβαδών δύο κύκλων με ακτίνες $4x$ και $4x^2 - 1$.
- 11** α) Αν ο αριθμός k είναι ακέραιος, να αποδείξετε ότι ο αριθμός $k^2 + k$ είναι άρτιος.
β) Να αποδείξετε ότι η διαφορά κύβων δύο διαδοχικών ακεραίων, αν διαιρεθεί με το 6, δίνει υπόλοιπο 1.
γ) Να αποδείξετε ότι η διαφορά τετραγώνων δύο περιττών ακεραίων είναι πολλαπλάσιο του 8.
- 12** α) Να κάνετε τη διαίρεση $(x^6 - 1) : (x - 1)$ και χρησιμοποιώντας την ταυτότητα της Ευκλείδειας διαίρεσης να αποδείξετε ότι ο αριθμός $7^6 - 1$ είναι πολλαπλάσιο του 6.
β) Να κάνετε τη διαίρεση $(x^5 + 1) : (x + 1)$ και χρησιμοποιώντας την ταυτότητα της Ευκλείδειας διαίρεσης να αποδείξετε ότι ο αριθμός $2^{15} + 1$ είναι πολλαπλάσιο του 9.
- 13** α) Να αποδείξετε ότι $\frac{1}{(x - 1)x} = \frac{1}{x - 1} - \frac{1}{x}$.
β) Στην προηγούμενη ισότητα να αντικαταστήσετε το x διαδοχικά με τις τιμές 2, 3, 4, ..., 2008 και να αποδείξετε ότι $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{2007 \cdot 2008} = \frac{2007}{2008}$



ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 1ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Α. ΜΟΝΩΝΥΜΑ – ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ

- **Αλγεβρική Παράσταση** είναι μια έκφραση που περιέχει αριθμούς και μεταβλητές
π.χ. $2x^2 - 3xy + 4$
- **Αριθμητική Τιμή** μιας παράστασης είναι ο αριθμός που προκύπτει, αν αντικαταστήσουμε τις μεταβλητές της με αριθμούς και κάνουμε τις πράξεις.
- **Μονώνυμο** λέγεται μια ακέραια αλγεβρική παράσταση στην οποία μεταξύ των αριθμών και των μεταβλητών της σημειώνεται μόνο η πράξη του πολλαπλασιασμού.
π.χ. $-3x^2y$ (-3 συντελεστής, x^2y κύριο μέρος του μονώνυμου).
- **Όμοια** λέγονται τα μονώνυμα που έχουν το ίδιο κύριο μέρος, π.χ. $-3x^2y$, $7x^2y$, $-x^2y$

Πράξεις με μονώνυμα

– η **Πρόσθεση** και η **Αφαίρεση** μονωνύμων έχει σαν αποτέλεσμα μονώνυμο, εφόσον αυτά είναι όμοια.

Άθροισμα ομοίων μονωνύμων είναι ένα μονώνυμο όμοιο με αυτά, που έχει συντελεστή το άθροισμα των συντελεστών τους.

$$\text{π.χ. } 2x^2y + 3x^2y - x^2y = 4x^2y$$

Αναγωγή ομοίων όρων λέγεται η αντικατάσταση των ομοίων μονωνύμων με το άθροισμά τους.

$$\text{π.χ. } 6x^2 + 2x - 4x^2 + 3x = 2x^2 + 5x$$

– ο **Πολλαπλασιασμός** και η **Διαίρεση** μονωνύμων γίνονται είτε τα μονώνυμα είναι όμοια είτε όχι.

Γινόμενο μονωνύμων είναι ένα μονώνυμο με συντελεστή το γινόμενο των συντελεστών τους και κύριο μέρος το γινόμενο όλων των μεταβλητών τους, με εκθέτη καθεμιάς το άθροισμα των εκθετών τους. π.χ. $(3x^2y) \cdot (-2xy^3) = -6x^3y^4$

Πηλίκο δύο μονωνύμων είναι η αλγεβρική παράσταση που είναι γινόμενο του διαιρέτου με τον αντίστροφο του διαιρέτη.

$$\text{π.χ. } (-12x^4y) : (3x^2y) = -12x^4y \cdot \frac{1}{3x^2y} = \frac{-12x^4y}{3x^2y} = -4x^2$$

- **Πολυώνυμο** λέγεται το άθροισμα μονωνύμων, που δύο τουλάχιστον από αυτά δεν είναι όμοια. π.χ. $3x^2y - 5xy + 2$ (Το μονώνυμο $3x^2y$, $5xy$, 2 λέγονται **όροι** του πολυωνύμου).

Πράξεις με πολυώνυμα

– **Για να προσθέσουμε - αφαιρέσουμε** πολυώνυμα βγάζουμε τις παρενθέσεις και κάνουμε αναγωγή ομοίων όρων.

– **Για να πολλαπλασιάσουμε**

α) **μονώνυμο με πολυώνυμο** πολλαπλασιάζουμε το μονώνυμο με κάθε όρο του πολυωνύμου και στη συνέχεια κάνουμε αναγωγή ομοίων όρων.

β) **πολυώνυμο με πολυώνυμο** πολλαπλασιάζουμε κάθε όρο του ενός πολυωνύμου με κάθε όρο του άλλου και στη συνέχεια κάνουμε αναγωγή ομοίων όρων.

– Αν έχουμε δύο πολυώνυμα $\Delta(x)$ και $\delta(x)$ με $\delta(x) \neq 0$ και κάνουμε τη διαίρεση $\Delta(x) : \delta(x)$, τότε βρίσκουμε ένα μοναδικό ζεύγος πολυωνύμων $\pi(x)$ και $υ(x)$ για τα οποία ισχύει: $\Delta(x) = \delta(x)\pi(x) + υ(x)$ (**Ταυτότητα της Ευκλείδειας διαίρεσης**) όπου το $υ(x)$ ή είναι ίσο με μηδέν ή έχει βαθμό μικρότερο από το βαθμό του $\delta(x)$. Αν $υ(x) = 0$, τότε η διαίρεση λέγεται **τέλεια** και τα $\delta(x)$ και $\pi(x)$ λέγονται **παράγοντες** ή **διαιρέτες** του $\Delta(x)$.

Β. ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

- Οι ισότητες που περιέχουν μεταβλητές και οι οποίες αληθεύουν για όλες τις τιμές των μεταβλητών τους ονομάζονται **ταυτότητες**.

Αξιοσημείωτες ταυτότητες είναι:

Τετράγωνο αθροίσματος	$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
Τετράγωνο διαφοράς	$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
Κύβος αθροίσματος	$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
Κύβος διαφοράς	$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$
Γινόμενο αθροίσματος επί διαφοράς	$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$
Διαφορά κύβων	$(a - b)(a^2 + ab + b^2) = a^3 - b^3$
Άθροισμα κύβων	$(a + b)(a^2 - ab + b^2) = a^3 + b^3$

Γ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ

- Παραγοντοποίηση** είναι ο μετασχηματισμός μιας παράστασης από άθροισμα σε γινόμενο. Η παραγοντοποίηση γίνεται σε παράσταση που υπάρχει:

Κοινός παράγοντας σ' όλους τους όρους	$ax + bx = x(a + b)$
Κοινός παράγοντας σε ομάδες όρων της παράστασης	$ax + ay + bx + by = a(x + y) + b(x + y) = (a + b)(x + y)$
Διαφορά τετραγώνων	$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$
Άθροισμα - Διαφορά κύβων	$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$ $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$
Ανάπτυγμα τετραγώνου	$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$ $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$
Τριώνυμο της μορφής $x^2 + (a + b)x + ab$	$x^2 + (a + b)x + ab = (x + a)(x + b)$

Δ. ΡΗΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Μια αλγεβρική παράσταση που είναι κλάσμα με όρους πολυώνυμα, λέγεται **ρητή αλγεβρική παράσταση** ή απλώς **ρητή παράσταση**.

π.χ. $\frac{2x^2 - 5}{x + 4}$

Οι μεταβλητές μιας ρητής παράστασης δεν μπορούν να πάρουν τιμές που μηδενίζουν τον παρονομαστή. Για να απλοποιήσουμε μια ρητή αλγεβρική παράσταση, παραγοντοποιούμε και τους δύο όρους της και διαγράφουμε τον κοινό παράγοντα. Οι πράξεις με τις ρητές παραστάσεις γίνονται όπως και οι πράξεις των αριθμητικών κλασμάτων.